

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00823&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 00823. Рани повік, пресептальна флегмона та флегмона орбіти

Автор: Paula Summanen
Редактори оригінального тексту: -
Дата останнього оновлення: 2017-09-04

Основні положення

- При інфекціях, які розповсюдились до очної западини (флегмона орбіти), потрібна невідкладна госпіталізація до стаціонару.
- Див. також настанову “Флегмона обличчя в дітей”
[настанова 00971] Целюліт обличчя у дітей].

Пресептальна флегмона

- Пресептальна флегмона - це тяжке гнійне запалення повік інфекційного походження (зобр. [зображення 01000] Preseptal cellulitis in ...).
 - На відміну від звичайної ранової інфекції, при пресептальній флегмоні інфікована вся повіка. Однак, інфекція не розповсюджується до очної ямки, як при флегмоні орбіти (тобто локалізується пресептально), а отже, не становить небезпеки для життя пацієнта.
 - Пресептальна флегмона майже неминуче розвивається за відсутності лікування рани повіки, яка стала інфікованою (наприклад, у пацієнтів з алкоголізмом). Рани спричинені падіннями та ударами ділянкою орбіти об землю.

Діагностика

- Гнійна та, зазвичай, розповсюджена ранова інфекція повіки, яка може призвести до вираженого некрозу шкіри
- Диференційна діагностика
 - Дане захворювання необхідно відрізнити від флегмони орбіти, при якій спостерігаються біль, зміщення очного яблука вперед і диплопія.
 - Гострий дакриоцистит проявляється набряком та почервонінням навколо сльозового мішка у ділянці внутрішнього кута ока та іноді супроводжується лихоманкою.

Лікування

- Пацієнта госпіталізують, оцінюють ситуацію, здійснюють санацію рани та розпочинають застосування системних антибіотиків.
- При рані повіки, яка не ускладнилася пресептальною флегмоною, ведення пацієнта може здійснюватися первинною медичною допомогою. Рекомендовано призначення системних антибіотиків, оскільки інфекція легко розповсюджується.
- Препаратом вибору є антибіотики цефалоспоринового ряду (наприклад, цефалексин); мазь і очні краплі з хлорамфеніколом застосовують місцево. Рану слід промивати тричі на добу, можна накладати марлеву пов'язку, просякнуту м'яким парафіном, мазями, емульсією або кремом, та легку марлеву пов'язку.

Флегмона орбіти

- Флегмона орбіти - це інфекція очноямкової клітковини (постсептальна).
 - Є тяжким захворюванням, яке становить небезпеку як для зору, так і для життя; серед дітей смертність при флегмоні орбіти складає 5%.
 - До етіологічних факторів належать
 - інфекції навколоносових пазух (пансинусит)
 - мастоїдит
 - травма орбіти, особливо невиявлені сторонні тіла
 - пресептальна флегмона
 - гематогенне поширення (при сепсисі)

Симптоми та дані об'єктивного обстеження

- набряк і почервоніння повік, кон'юнктиви та очноямкової ділянки.
- біль високої інтенсивності, зміщення очного яблука вперед (проптоз), обмеження рухів очного яблука, диплопія
 - Діагноз встановлюється на основі вищевказаних даних
- Ураження зорового нерва, викликане інфекцією та набряком, спричиняє порушення зору та може швидко призвести до втрати зору.
- Інфекція також може розповсюдитися інтракраніально (до пазух твердої оболонки), що призводить до виникнення симптомів з боку центральної нервової системи (ЦНС) і смерті.

Лікування

- За підозри на флегмону орбіти необхідне невідкладне скерування до лікарні, в якій є відповідне оснащення для здійснення екстреної променевої діагностики (КТ, МРТ), офтальмологи та оториноларингологи.
- Лікування полягає в застосуванні антибіотиків широкого спектру дії внутрішньовенно, глюкокортикоїдів перорально та ретельному спостереженні. За наявності абсцесів (напр., гнійного пансинуситу) здійснюють їх розкриття та дренивання.

Настанови

- [Настанова 00971](#). Целюліт обличчя у дітей.

Зображення

- [Зображення 01000](#). Preseptal cellulitis in a child.



Автори та власники авторських прав: Anne Pitkäranta Duodecim Medical Publications Ltd

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: ebm00823 Ключ сортування: 037.016 Тип: EBM Guidelines

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2017-09-04

Автор(и): Paula Summanen Редактор(и): Leila Laatikainen Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd
Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

Навігаційні категорії
EBM Guidelines Ophthalmology

Ключові слова індексу
mesh: cellulitis, preseptal mesh: Cellulitis mesh: Eyelids mesh: eyelid wound mesh: Dacryocystitis
mesh: Wound Infection mesh: Blepharitis icpc-2: F72 icpc-2: F79 speciality: Ophthalmology