

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00821&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 00821. Заворот і виворіт повіки

Автор: Editors

Редактори оригінального тексту: -

Дата останнього оновлення: 2011-01-24

Основні положення

- Необхідно враховувати неправильне положення повіки як можливу причину рецидивуючих симптомів з боку ока в осіб похилого віку.
- Виворіт повіки (ектропіон) необхідно вилікувати до появи гіпертрофії кон'юнктиви чи виразок рогівки.
- Заворот повіки (ентропіон) необхідно вилікувати до появи виразок рогівки.

Симптоми та ознаки

- Частіше ушкоджується нижня повіка. З віком сполучна тканина повік стає менш щільною, кількість жирової тканини зменшується, шкіра стає тонкою, її еластичність знижується.

Заворот повіки

- Повіка загорнута всередину. Вії повернуті всередину та труться об рогівку, викликаючи біль або відчуття стороннього тіла, сльозотечу та почервоніння кон'юнктиви.
- Якщо подразнення продовжується, на рогівці з'являються помутніння та виразки, які сприяють розвитку вторинної інфекції.
- Даний стан зазвичай обумовлений похилим віком.

- Може також зустрічатися в молодших пацієнтів (наприклад, іммігрантів) у зв'язку з хронічною інфекцією (наприклад, трахомою).

Виворот повіки

- Повіка вивернута назовні. Як край, так і весь хрящ повіки може знаходитись в неправильному положенні. Оскільки кон'юнктива оголена, вона стає подразненою, гіперемованою та гіпертрофованою.
- На більш пізній стадії на оголеній кон'юнктиві та рогівці виникають виразки.
- Сенильний (старечий) виворот нижньої повіки є найпоширенішою аномалією повік.
- Прозоплегія (параліч лицевого нерва) може спричинити паралітичний виворот нижньої повіки (коловий м'яз ока (m. orbicularis oculi), який відповідає за закриття повік, іннервується лицевим нервом).
- Рубці на шкірі можуть бути причиною натягу шкіри і можливого вивороту нижньої повіки.

Лікування

- І при завороті, і при вивороті повіки пацієнту необхідно призначити симптоматичне лікування зволожуючими засобами, яке зменшить висихання рогівки та знизить травмуючий вплив вій на рогівку.
 - Якщо око залишається відкритим, виникає сухість, в такому випадку можна на ніч заклеювати око медичним пластиром для того, щоб воно було повністю закритим (наприклад, якщо пацієнт проходить лікування у стаціонарі).
- Натяг лейкопластиром здатний тимчасово полегшувати симптоми завороту повіки: для надання повіці правильної позиції застосовують медичний пластир типу "метелик" (зі звуженням посередині).
- Заворот і виворот повіки потребують хірургічного лікування. Хірургічна операція не є обов'язковою, якщо неправильне положення повіки виражене незначно, проте при появі симптомів (подразнення, сльозотеча, почервоніння, рецидивуючі кон'юнктивіти) показане хірургічне втручання.
 - Операцію слід проводити на ранній стадії.

- Заворот повіки необхідно виправити до моменту ураження рогівки.
- Виворот повіки необхідно скорегувати, поки не розвинулася гіпертрофія кон'юнктиви.

Пов'язані ресурси

- Література [пов'язані] [00952] Entropion and ectropion ...]

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: ebm00821 Ключ сортування: 037.010 Тип: EBM Guidelines

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2011-01-24

Автор(и): Editors Автор(и) попередніх версій статті: Juha Holopainen Anna-Maija Paakkala Редактор(и):
Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

Навігаційні категорії
EBM Guidelines Ophthalmology

Ключові слова індексу
mesh: Entropion mesh: Ectropion mesh: Eyelashes mesh: Eyelids icpc-2: F99 speciality: Ophthalmology