


Володимир ГЕЛЬМБОЛЬДТ

Олексій НІКІТІН

Іван ШИШКІН

# ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ФАРМАКОЛОГІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ.

## Частина 1



## Зміст


|   |            |
|---|------------|
| <b>I. ЗАГАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ</b>                         | <b>3</b>   |
| 1.1. Якісний аналіз катіонів                                      | 3          |
| Тестові завдання за темою   | 9          |
| Ситуаційні задачі за темою  | 13         |
| 1.2. Якісний аналіз аніонів                                       | 13         |
| Тестові завдання за темою   | 21         |
| Ситуаційні задачі за темою  | 24         |
| 1.3. Випробування на вміст домішок                                | 24         |
| Тестові завдання за темою   | 30         |
| 1.4. Визначення функціональних груп                               | 34         |
| Тестові завдання за темою   | 41         |
| <b>II. ЗАГАЛЬНООСАДЖУВАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ АЛКАЛОЇДНІ РЕАКТИВИ</b> | <b>47</b>  |
| <b>III. ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ</b>              | <b>48</b>  |
| <b>3. Нестероїдні протизапальні засоби</b>                        | <b>48</b>  |
| 3.1. Натрію саліцилат   | 48         |
| 3.2. Кислота ацетилсаліцилова                                     | 50         |
| 3.3. Метамізолу натрієва сіль                                     | 54         |
| 3.4. Бутадіон   | 57         |
| 3.5. Парацетамол  | 60         |
| 3.6. Натрію диклофенак  | 65         |
| Тестові завдання за темою   | 68         |
| Ситуаційні задачі за темою  | 72         |
| <b>4. Наркотичні анальгетики</b>                                  | <b>72</b>  |
| 4.1. Морфіну гідрохлорид  | 72         |
| 4.2. Кодеїн / Кодеїну фосфат                                      | 75         |
| 4.3. Фентаніл   | 79         |
| 4.4. Промедол   | 81         |
| Тестові завдання за темою   | 84         |
| Ситуаційні задачі за темою  | 88         |
| <b>5. Снодійні засоби</b>   | <b>88</b>  |
| 5.1. Барбітурати  | 88         |
| 5.1.1. Барбітал   | 88         |
| 5.1.2. Фенобарбітал   | 93         |
| 5.1.3. Бензонал   | 98         |
| 5.1.4. Етамінал-натрію  | 103        |
| 5.1.5. Гексенал   | 107        |
| 5.1.6. Тіопентал-натрій   | 110        |
| 5.2. Хлоралгідрат   | 113        |
| 5.3. Броміловал   | 114        |
| Тестові завдання за темою   | 116        |
| Ситуаційні задачі за темою  | 120        |
| <b>ЛІТЕРАТУРА</b>   | <b>121</b> |

## I. ЗАГАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ

### 1.1. Якісний аналіз катіонів

#### Алюміній $Al^{3+}$

До водного розчину, який містить катіон алюмінію, додають кислоту хлористоводневу розведену і реактив тіоацетаміду; не має утворюватися осад (дослідження на відсутність домішок важких металів). Потім додають розчин натрію гідроксиду розведеного – утворюється гелеподібний білий осад, який розчиняється при наступному додаванні надлишку реактиву:




До одержаного розчину поступово додають розчин амонію хлориду – знову утворюється гелеподібний білий осад:




#### Амонію солі й солі летких основ $NH_4^+$

До розчину субстанції додають магнію оксид. Амоніак, що утворився, пропускають крізь суміш розчину кислоти хлористоводневої і розчину метилового червоного; забарвлення індикатора переходить у жовте. Отриманий іон амонію ідентифікують за утворенням жовтого осаду з розчином натрію кобальтинітриту:




При нагріванні солей амонію і солей летких основ з розчином натрію гідроксиду виділяється пари амоніаку або летких основ, які виявляють за запахом і лужною реакцією (червоний лакмус забарвлюється у синій колір):



### **Вісмут (Бісмут) $\text{Bi}^{3+}$**


a) З розчином натрію сульфіду – утворюється коричневий осад:



б) З розчином тіосечовини – утворюється жовтувато-оранжеве забарвлення або оранжевий осад, який не знебарвлюється при додаванні розчину натрію фториду:




в) До субстанції додають кислоту сульфатну розведену та фільтрують. До фільтрату додають декілька крапель калію йодиду – утворюється чорний осад, який розчинний у надлишку реактиву з утворенням жовто-оранжевого розчину:




### **Залізо (ІІ) (Ферум (ІІ)) $\text{Fe}^{2+}$**

a) Ідентифікують з розчином калію фериціаніду – утворюється синій осад (Турнбулева синь), нерозчинний у кислоті хлористоводневій розведеній:




б) До субстанції розчин амонію сульфіду – утворюється чорний осад, який розчинний у розведених мінеральних кислотах:




### **Залізо (ІІІ) (Ферум (ІІІ)) $\text{Fe}^{3+}$**


- a)** З розчином калію тіоціанату в середовищі кислоти хлористоводневої – з'являється криваво-червоне забарвлення (бутафорська кров):



Потім до однієї половини одержаного розчину додають ізоаміловий спирт або ефір і струшують – після розшарування органічний шар набуває рожевого забарвлення. До другої – додають розчин меркурію (II) хлориду – червоне забарвлення розчину знає:




- б)** З розчином калію фероціаніду – утворюється синій осад (Берлинська лазур), нерозчинний у кислоті хлористоводневій розведеній:




### **Калій $K^+$**

- а)** Сіль калію, внесена у безбарвне полум'я, забарвлює його у фіолетовий колір або при розгляданні крізь сине скло – у пурпурово-червоний.
- б)** З розчином кислоти винної при охолодженні утворюється білий кристалічний осад:




- в)** При взаємодії з розчином натрію кобальтинітриту у присутності кислоти оцтової розведеної – утворюється жовтий або оранжево-жовтий осад:




### **Кальцій $Ca^{2+}$**

- а)** Сіль кальцію, змочена кислотою хлористоводневою розведеною і внесена у безбарвне полум'я, забарвлює його в оранжево-червоний колір.


б) З розчином гліоксальгідроксианілу в присутності натрію гідроксиду, натрію карбонату і хлороформу – при струшуванні хлороформний шар набуває червоного забарвлення:



в) З розчином калію фероціаніду в середовищі кислоти оцтової у присутності амонію хлориду утворюється білий кристалічний осад:



г) З розчином амонію оксалату утворюється білий осад, нерозчинний у кислоті оцтовій розведеній і розчині амоніаку, розчинний у розведених мінеральних кислотах:




### Магній $Mg^{2+}$

З розчином динатрію гідрофосфату у присутності розчину амоніаку розведеного і амонію хлориду утворюється білий кристалічний осад:




### Натрій $\text{Na}^+$

- а) Сіль натрію, змочена кислотою хлористоводневою розведеною і внесена в безбарвне полум'я, забарвлює його у жовтий колір.
- б) З розчином калію піроантимонату (калію гексагідроксостибіату (V)) – утворюється білий осад:




в) З розчином реактиву метоксифенілоцтвої кислоти – утворюється об'ємний білий кристалічний осад:




Осад розчиняється при додаванні розчину амоніаку розведеного і не випадає знову при наступному додавані розчину амонію карбонату.

### **Ртуть (Меркурій) $Hg^{2+}$**

- a) При взаємодії з очищеною мідною фольгою з'являється темно-сіра пляма, яка при натиренні стає бліскучою, а при нагріванні – зникає:



- б) З розчином натрію гідроксиду розведеним – утворюється густий осад жовтого кольору:




- в) З розчином калію йодиду солі ртуті (ІІ) утворюють червоний осад, розчинний у надлишку цього реагенту:



### **Свинець (Плюмбум) $Pb^{2+}$**

- a) З розчином калію хромату в середовищі кислоти оцтової – утворюється жовтий осад:



При додаванні розчину катрію гідроксиду концентрованого осад розчиняється:





- б) З розчином калію йодиду в середовищі кислоти оцтової – утворюється жовтий осад (реакція «Золотого дощу»):



При кип'ятінні осад розчиняється, а при охолодженні випадає знову у вигляді блискучих жовтих пластинок.



### **Срібло (Аргентум) Ag<sup>+</sup>**

З кислотою хлористоводневою утворюється білий сирнистий осад, який розчиняється при додаванні розчину амоніаку розведеного:




### **Сурма (Стибій) Sb<sup>3+</sup>, Sb<sup>5+</sup>**

З розчином натрію сульфіду в присутності розчину калію-натрію тартрату утворюється оранжево-червоний осад, який розчиняється при додаванні розчину натрію гідроксиду:




### **Цинк Zn<sup>2+</sup>**

a) З розчином натрію гідроксиду концентрованим утворюється білий осад, розчинний у надлишку реактиву:



При додаванні до отриманого розчину амонію хлориду осад не утворюється, а при додаванні розчину натрію сульфіду – утворюється білий пластівчастий осад, який розчиняється в мінеральних кислотах:



- 6) З розчином калію фероціаніду утворюється білий осад, нерозчинний у кислоті хлористоводневій розведеній:



### Тестові завдання за темою: «Якісний аналіз катіонів»

1. Для виявлення катіонів амонію використовують комплексну сполуку ртуті, а саме реактив Несслера. Яка хімічна формула цієї сполуки?
  - A.  $\text{K}_2[\text{HgCl}_4]$
  - B.  $[\text{Hg}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
  - C.  $\text{K}_2[\text{Hg}(\text{CN})_4]$
  - D.  $\text{K}_2[\text{HgI}_4]^*$
  - E.  $[\text{Hg}(\text{NH}_3)_4](\text{NO}_3)_2$
2. При додаванні розведеного розчину хлористоводневої кислоти до аналізованого розчину утворився білий сирнистий осад, повністю розчинний в розчині аміаку. Про присутність яких іонів це свідчить?
  - A. Іонів кальцію
  - B. Іонів натрію
  - C. Іонів срібла\*
  - D. Іонів заліза (ІІ)
  - E. Іонів калію.
3. При нагріванні досліджуваного розчину з лугом відчувають різкий запах і спостерігають появу синього забарвлення на червоному лакмусовому папері, змоченого водою. Які іони дають такий ефект?
  - A. Нітрат-іони
  - B. Ацетат-іони
  - C. Іони калію
  - D. Іони амонію\*
  - E. Карбонат-іони.

- 4.** Сухий залишок, отриманий після упарювання аналізованого розчину, забарвлює безбарвне полум'я пальника в жовтий колір, а при розгляді через синє скло - в фіолетовий. Які катіони знаходилися в сухому залишку?
- A.  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Sr}^{2+}$   
B.  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$   
C.  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^{+*}$   
D.  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$   
E.  $\text{Li}^+$ ,  $\text{Ba}^{2+}$
- 5.** В аналітичній практиці для виявлення іонів кальцію використовують граничну дикарбонову кислоту. Ця ж реакція служить для якісного виявлення цієї кислоти. Про яку з наведених нижче дикарбонових кислот йдеться?
- A. Адипінова кислота  
B. Щавлева кислота\*  
C. Малонова кислота  
D. Глутарова кислота  
E. Янтарна кислота.
- 6.** У досліджуваний розчин додали розчин калію йодиду. Випав золотисто-жовтий осад, який розчиняється у гарячій воді, надлишку реагенту й оцтової кислоти. Це свідчить про присутність у розчині:
- A. Катіонів вісмуту  
B. Катіонів срібла  
C. Катіонів ртуті (I)  
D. Катіонів свинцю\*  
E. Катіонів ртуті (II)
- 7.** Катіони  $\text{Fe}^{3+}$  утворюють з тіоціанат-іонами комплексні сполуки. Який аналітичний ефект при цьому спостерігають?
- A. Випадає осад червоного кольору  
B. Утворюється коричневе кільце  
C. Розчин забарвлюється в синій колір  
D. Розчин забарвлюється в червоний колір\*  
E. Утворюється «берлінська лазур»
- 8.** Вкажіть тип реакції, що застосовується для виявлення катіона  $\text{Fe}^{3+}$ :
- A. Комплексоутворення\*  
B. Осадження  
C. Гідролізу  
D. Нейтралізації  
E. Відновлення.

**9.** У якісному аналізі специфічним реагентом на катіони  $\text{Fe}^{2+}$  є:

- A.  $\text{K}_2\text{Na}[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$
- B.  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]^*$
- C.  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
- D.  $\text{NaOH}$
- E.  $\text{NH}_4\text{OH}$

**10.** Калій гексаціаноферат (ІІ) взаємодіє з іонами цинку з утворенням ... кристалічного осаду складу...

- A. зеленого,  $\text{Zn}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
- B. білого,  $\text{K}_2\text{Zn}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2^*$
- C. жовтого,  $\text{K}_2\text{Zn}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$
- D. синього,  $\text{Zn}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
- E. фіолетового,  
 $\text{KZn}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

**11.** Натрій сульфід з іонами цинку утворює ... осад ..., розчинний в ... кислотах.

- A. білий з жовтуватим відтінком,  $\text{ZnSO}_4$ , мінеральних
- B. жовтуватий,  $\text{Zn}_2\text{S}$ , мінеральних
- C. білий,  $\text{ZnS}$ , ацетатній та ін. органічних
- D. білий,  $\text{ZnS}$ , мінеральних\*
- E. білий,  $\text{ZnSO}_3$ , мінеральних

**12.** Фармакопейними реакціями на іони цинку, згідно вимог ДФУ, є реакції з:

- A.  $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
- B.  $\text{NaOH}$ , дитизоном
- C.  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ,  
 $(\text{NH}_4)_2[\text{Hg}(\text{SCN})_6]$
- D.  $\text{K}_2\text{S}$ ,  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
- E.  $\text{Na}_2\text{S}$ ,  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]^*$

**13.** Срібла нітрат в очних краплях ідентифікують реакцією з...

- A. купрум (ІІ) ацетатом
- B. калій перманганатом
- C. реактивом Неслера
- D. купруму сульфатом
- E. натрію хлоридом\*

**14.** При ідентифікації кальцію хлориду розчином амонію оксалату спостерігається ...

- A. виділення вуглекислого газу
- B. виділення бурого газу
- C. виділення безбарвного газу
- D. утворення білого осаду\*
- E. жовте забарвлення осаду

**15.3** калій гексаціанофератом (ІІ) виявляють катіон ...

- A. Амонію
- B. Калію

**C.** Літію

**D.** Кальцію\*

**E.** Натрію

**16.3** хлоридною кислотою або

натрій хлоридом утворює білий сирнистий осад катіон ...

**A.** Купруму (ІІ)

**B.** Цинку

**C.** Аргентуму\*

**D.** Магнію

**E.** Кальцію

**17.** До лабораторії з контролю якості лікарських засобів надійшов протиіразковий препарат, що містить вісмуту субцитрат. При проведенні реакції на катіон вісмуту спостерігалося утворення жовтувато-оранжевого забарвлення. Який реагент використовувався в цьому випробуванні?

**A.** Тіосечовина\*

**B.** Гліоксальгідроксіаніл

**C.** Хлористоводнева кислота

**D.** Натрію гідроксид

**E.** Калію ацетат

**18.** До лабораторії з контролю якості лікарських засобів надійшла субстанція антибіотика «Ампіциліну натрію». Іон натрію

ідентифікували реакцією з розчином калію піроантимонату за утворенням осаду такого кольору:

**A.** Білого\*

**B.** Синього

**C.** Жовтого

**D.** Червоного

**E.** Зеленого

**19.** При проведенні

фармацевтичного аналізу лікарської речовини виконали реакцію з розчином натрію гідроксиду при нагріванні. В результаті цієї реакції виділився газ із характерним запахом, під дією якого вологий червоний лакмусовий папірець посинів. Які катіони ідентифікували у складі лікарської речовини?

**A.** Амонію\*

**B.** Магнію

**C.** Кальцію

**D.** Натрію

**E.** Калію

**20.** При проведенні

фармацевтичного аналізу зразок лікарської речовини, змочений хлористоводневою кислотою розведеною, внесли у безбарвне

полум'я. Поява оранжево-червоного забарвлення дозволяє ідентифікувати такий катіон:

**A.** Кальцію\*

**B.** Натрію  
**C.** Калію  
**D.** Амонію  
**E.** Барію


### Ситуаційні задачі за темою: «Якісний аналіз катіонів»

- У розчині присутні йони  $\text{NH}_4^+$  і  $\text{Fe}^{3+}$ . Який аналітичний ефект буде спостерігатися при добавлянні до цього розчину реактиву Нессслера? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
- У розчині ( $\text{pH}=7$ ) присутні йони  $\text{K}^+$  і  $\text{NH}_4^+$ . Який аналітичний ефект буде спостерігатися при добавлянні до цього розчину гексанітрокобальтату натрію? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
- На розчин, що містить катіони  $\text{Ag}^+$  і  $\text{Pb}^{2+}$ , подіяли розчином хромату калію. Випав осад (вкажіть колір), який обробили розчином аміаку. Що спостерігається? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

### 1.2. Якісний аналіз аніонів

#### Ацетати $\text{CH}_3\text{COO}^-$


- a)** Нагрівання субстанції з рівною кількістю щавлевої кислоти – виділяється кислота оцтова, яку виявляють за запахом:




- б)** З розчином лантану (ІІІ) нітрату в присутності йоду і розчину амоніаку при нагріванні утворюється синє забарвлення або осад синього кольору:



- в)** З розчином заліза (ІІІ) хлориду – з'являється червоно-буре забарвлення, яке зникає при додаванні кислот мінеральних роздедених:




г) Взаємодія зі спиртом у присутності кислоти сульфатної концентрованої – утворюється етилацетат, який має характерний запах (приємний фруктовий запах):




### Бензоати $C_6H_5\text{-COO}^-$


а) З розчином заліза (ІІІ) хлориду утворюється жовто-рожевий осад, розчинний в ефірі:



б) Змочують суху субстанцію кислотою сульфатною концентрованою і обережно нагрівають дно пробірки; на внутрішніх стінках пробірки з'являється білий наліт (за рахунок сублімації кислоти бензойної):





в) З розчином кислоти хлористоводневої утворюється білий осад кислоти бензойної, яку ідентифікують за температурою плавлення ( $122,3^\circ\text{C}$ ):




### Хлориди $\text{Cl}^-$

а) З розчином срібла нітрату в присутності кислоти нітратної розведеної утворюється білий сирнистий осад, розчинний у розчині амоніаку:




6) Реакцію сухої речовини з калієм дихроматом і кислотою сульфатною – папір, просочений розчином дифенілкарбазиду, забарвлюється у фіолетово-червоний колір.


Хлориди взаємодіють з калієм дихроматом у присутності кислоти сульфатної з утворенням леткої сполуки – хлористого хромілу:



Хлористий хроміл окиснює дифенілкарбазид до безбарвного дифенілкарбазону:





Далі утворюється внутрішньокомплексна сполука фіолетово-червоного кольору:




### Броміди Br<sup>-</sup>



a) З розчином срібла нітрату у присутності кислоти нітратної розведеної утворюється жовтуватий сирнистий осад, який повільно розчиняється у розчину амоніаку:



6) Із пломбуму (IV) оксидом у присутності кислоти оцтової виділяється бром, який ідентифікують за утворенням бромзаміщеного фуксину фіолетового кольору (фуксин забарвлений у червоний колір):




**в)** З розчином хлораміну Т у присутності кислоти хлористоводневої розведеної і хлороформу утворюється бром, який забарвлює хлороформний шар у жовто-бурий колір:




### Йодиди I<sup>-</sup>

**а)** З розчином срібла нітрату у присутності кислоти нітратної розведеної утворюється світло-жовтий сирнистий осад, який не розчиняється у розчині амоніаку:




**б)** З розчином калію дихромату в середовищі кислоти сульфатної розведеної у присутності хлороформу утворюється йод, який забарвлює хлороформний шар у фіолетовий або фіолетово-червоний колір:




### Фториди F<sup>-</sup>


**а)** З розчином кальцію хлориду утворюється біла опалесценція:



**б)** Знебарвлення червоного комплексу заліза (ІІІ) тіоцианату ( $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ ):





**в)** Ідентифікують за реакцією з Цирконієвим комплексом алізарину. Червоно-фіолетове забарвлення змінюється до жовтого:



### Карбонати $\text{CO}_3^{2-}$ й гідрокарбонати $\text{HCO}_3^-$

a) З кислотою оцтовою розведеною спостерігається бурхливе виділення бульбашок газу, при пропусканні якого через розчин барію гідроксиду утворюється білий осад, розчинний у кислоті хлористоводневій:



б) З насиченим розчином магнію сульфату карбонати утворюють білий осад:




Гідрокарбонати утворюють білий осад лише при кип'ятінні суміші:




в) Розчин карбонатів при додаванні розчину фенолфталейну забарвлюються у червоний колір (відмінність від гідрокарбонатів, розчини яких залишаються безбарвними).

### Hімрати $NO_3^-$

- a) Взаємодія з сумішшю нітробензолу і кислоти сульфатної концентрованої; при подальшому додаванні до суміші розчину натрію гідроксиду і ацетону верхній шар набуває темно-фіолетового забарвлення:




- б) Не знебарвлюють розчин калію перманганату, підкислений кислотою сульфатною розведеною (відмінність від нітратів).
- в) Взаємодія з реактивом дифеніламіном. Утворюється сине забарвлення:




### Hімрати $NO_2^-$


- а) З розчином антипірину у присутності кислоти хлористоводневої розведеної утворюється смарагдово-зелене забарвлення (відмінність від нітратів):



- б) Взаємодія з реактивом дифеніламіном. Утворюється сине забарвлення:




в) Знебарвлення розчину калію перманганату у присутності сульфатної кислоти:




### Саліцилати $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COO}^-$

а) З розчином заліза (ІІІ) хлориду утворюється фіолетове забарвлення, яке не зникає після додавання кислоти оцтової:






б) З розчином кислоти хлористоводневої утворюється білий осад кислоти саліцилової, яку ідентифікують за температурою плавлення ( $159^\circ\text{C}$ ):




### Силікати

Ідентифікують за реакцією з натрію фторидом у присутності кислоти сульфатної концентрованої у свинцевому або платиновому тиглі. Тигель накривають прозорою пластиковою пластинкою з краплею води на її внутрішній поверхні і обережно нагрівають; через короткий проміжок часу навколо краплі води з'являється біле кільце:



### Сульфати $\text{SO}_4^{2-}$

а) З розчином барію хлориду у середовищі кислоти хлористоводневої розведененої утворюється білий осад:



- б) Сульфати не знебарвлюють розчин йоду (на відміну від сульфітів і дитіонітів).

### Сульфіти $\text{SO}_3^{2-}$


- а) З розчином кислоти хлористоводневої розведеної поступово виділяється сірчистий газ (сульфур IV оксид), який виявляється за характерним різким запахом:



- б) При додаванні розчину йоду спостерігається його знебарвлення:




- в) До субстанції додають розчин барію хлориду – утворюється білий осад, який розчинний у розведеній кислоті хлористоводневій (відмінність від сульфатів):




### Фосфати $\text{PO}_4^{3-}$

- а) З розчином срібла нітрату; утворюється жовтий осад, колір якого не змінюється при кип'ятінні і який розчиняється при додаванні розчину амоніаку:



- б) З молібдено-ванадієвим реактивом утворюється жовте забарвлення:



## Тестові завдання за темою: «Якісний аналіз аніонів»

1. До лабораторії з контролю якості лікарських засобів надійшов муколітичний препарат, який містить амброксолу гідрохлорид. Для виявлення хлорид-іонів при його ідентифікації необхідно використати розчин:
  - A. Срібла нітрату\*
  - B. Барію сульфату
  - C. Гліоксалльгідроксіанілу
  - D. Калію фероціаніду
  - E. Дифеніламіну
2. Дексаметазон – гормональний засіб, у структурі якого наявний ковалентно зв’язаний фтор. Це дозволяє після мінералізації субстанції ідентифікувати фторид-іони за допомогою розчину:
  - A. Кальцію хлориду\*
  - B. Натрію хлориду
  - C. Амонію оксалату
  - D. Срібла нітрату
  - E. Натрію ацетату
3. Провізор-аналітик ідентифікує протимікробний засіб «Ципрофлоксацину гідрохлорид». Для виявлення хлорид-іона він проводить реакцію в присутності сірчаної кислоти концентрованої з таким реагентом:
  - A. Калію дихромату\*
  - B. Натрію гідроксиду
  - C. Магнію сульфату
4. У центральній аналітичній лабораторії фармацевтичного підприємства здійснюється контроль якості 0,1% ін’екційного розчину атропіну сульфату. За рахунок сульфат-іонів ідентифікувати діючу речовину можна при взаємодії з таким реагентом:
  - A. Барію хлориду\*
  - B. Міді (ІІ) сульфат
  - C. Калію йодиду
  - D. Натрію гідрокарбонату
  - E. Амонію хлориду
5. Під час фармацевтичного аналізу лікарської субстанції провели реакцію з антипірином (феназоном) у присутності хлористоводневої кислоти розведеної. Поява зеленого забарвлення дозволяє ідентифікувати:
  - A. Нітрити\*
  - B. Сульфати
  - C. Фториди
  - D. Броміди
  - E. Йодиди
6. При дії оцтової кислоти розведеної на зразок лікарської субстанції спостерігається бурхливе виділення бульбашок газу, що викликає помутніння розчину барію гідроксиду. Це випробування дозволяє ідентифікувати:
  - A. Карбонати\*

- B.** Фториди  
**C.** Нітрати  
**D.** Сульфати  
**E.** Хлориди
- 7.** Провізор-аналітик виконує експрес-аналіз рідкої лікарської форми, що містить кальцію хлорид. Ідентифікацію хлорид-іона він проводить реакцією з розчином:
- A.** срібла нітрату\*
  - B.** калію піроантимонату
  - C.** натрію тетрафенілборату
  - D.** амонію оксалату
  - E.** барію хлориду
- 8.** До досліджуваного розчину додали хлороформ та розчин натрій нітрату. Хлороформний шар забарвився у червоно-фіолетовий колір. Це свідчить про присутність у розчині:
- A.** бромід-іонів
  - B.** хлорид-іонів
  - C.** йодид-іонів\*
  - D.** сульфіт-іонів
  - E.** фторид-іонів
- 9.** Нітрат-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:
- A.** Кристалічного антипірину в присутності розведеної  $\text{HCl}^*$
  - B.** Кристалічного натрію тіосульфату
  - C.** Диметилглюксиму
  - D.** Кристаличного заліза (ІІІ) сульфату
  - E.** Дифенілкарбазону
- 10.** При проведенні проби на аніони нестійких кислот з характерним шипінням виділився безбарвний газ. Який аніон знаходився у розчині?
- A.**  $\text{CO}_3^{2-}*^*$
  - B.**  $\text{SO}_4^{2-}$
  - C.**  $\text{I}^-$
  - D.**  $\text{CH}_3\text{COO}^-$
  - E.**  $\text{SO}_3^{2-}$
- 11.** Який реагент використовують для відокремлення осаду  $\text{AgCl}$  від  $\text{AgI}$ ?
- A.** Водний розчин амоніаку\*
  - B.** Концентрована нітратна кислота
  - C.** Концентрований розчин калію хлориду
  - D.** Розведена нітратна кислота
  - E.** Розчин сульфатної кислоти
- 12.** Для ідентифікації йодид-іонів у досліджуваному зразку  $\text{KI}$  проводять фармакопейну реакцію з:
- A.** Калій дихроматом\*
  - B.** Натрій карбонатом
  - C.** Барій нітратом
  - D.** Плюмбум нітратом
  - E.** Меркурій (ІІ) нітратом
- 13.** При додаванні до аналізованого розчину розчину барію хлориду утворився білий осад, нерозчинний у кислотах. Це свідчить про присутність в аналізованому розчині:
- A.** Сульфат-іонів\*
  - B.** Хлорид-іонів
  - C.** Нітрат-іонів
  - D.** Перманганат-іонів

**E. Катіонів феруму (ІІ)**

**14.** Досліджуваний розчин з розчином нітрату срібла утворив білий драглистий осад, розчинний в аміаку. Укажіть сполуку отриманого осаду.

- A.** Аргентум хлорид\*
- B.** Аргентум бромід
- C.** Аргентум йодид
- D.** Аргентум роданід
- E.** Аргентум сульфід

**15.** При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином у середовищі сульфатної кислоти – з'явилося смарагдово-зелене забарвлення. Який аніон обумовив цей аналітичний ефект?

- A.** Хромат-іон
- B.** Хлорид-іон
- C.** Нітрит-іон\*
- D.** Бромід-іон
- E.** Йодид-іон

**16.** Для підтвердження наявності ковалентно зв'язаного хлору в структурі діуретичного засобу «Фуросемід» досліджувану субстанцію спікають із сумішшю калію карбонату та калію нітрату. Хлорид-іони, що утворилися, ідентифікують розчином:

- A.** Срібла нітрату\*
- B.** Амонію оксалату
- C.** Калію йодиду
- D.** Натрію сульфіду
- E.** Кальцію хлориду

**17.** Провізор-аналітик аналізує антиангінальний засіб гліцерину тринітрат (нітрогліцерин). Для ідентифікації нітрат-іонів, що утворюються після гідролізу, він використовує розчин:

- A.** Дифеніламіну\*
- B.** Лантану (ІІ) нітрату
- C.** Тіосечовини
- D.** Хлораміну
- E.** Глюксальгідроксіанілу

**18.** Провізор-аналітик виконує експрес-аналіз очних крапель, що містять цинку сульфат. Ідентифікацію сульфатів він проводить реакцією з розчином:

- A.** Барію хлориду\*
- B.** Амонію оксалату
- C.** Калію нітрату
- D.** Натрію нітрату
- E.** Заліза (ІІ) хлориду

**19.** Який із наведених реактивів дозволяє відкрити фосфат - іон?

- A.** Молібдено-ванадієвий реагент\*
- B.** Барію хлорид в кислому середовищі
- C.** 2Н розчин нітратної кислоти
- D.** Хлорна вода
- E.** Дифеніламін

**20.** Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії  $\text{NO}_3^-$  та  $\text{NO}_2^-$ -іонів з:

- A.** дифеніламіном і  $\text{H}_2\text{SO}_4$  конц.\*
- B.** розчином  $\text{KMnO}_4$

- C. розчином  $I_2$  у KI  
D. розчином  $AgNO_3$

E. розчином  $BaCl_2$


### **Ситуаційні задачі за темою: «Якісний аналіз аніонів»**

- Чи можна виявити хлорид-йони в розчині, який містить бромід-йони, з допомогою розчину нітрату срібла? Якщо можна, то яким чином?
- Запропонуйте якісні реакції на фосфат-йон. Напишіть рівняння відповідних реакцій.
- Запропонуйте характерні реакції для виявлення аніону  $F^-$ . Напишіть рівняння реакцій і вкажіть аналітичні ефекти.
- Запропонуйте характерні реакції для виявлення аніону  $CO_3^{2-}$  у суміші з гідрокарбонатами. Напишіть рівняння реакцій і вкажіть аналітичні ефекти.
- Запропонуйте характерні реакції для виявлення аніону  $SO_3^{2-}$ . Напишіть рівняння реакцій і вкажіть аналітичні ефекти.

### **1.3. Випробування на граничний вміст домішок**



#### **Солі амонію $NH_4^+$**

**Метод А.** Домішку визначають за допомогою лужного розчину калію тетрайодмеркурату (реактив Нессслера):



Через 5 хв. Жовте забарвлення випробуваного розчину має бути не інтенсивнішим за забарвлення еталону.

**Метод В.** Визначення солей амонію рекомендується проводити з папером, просоченим розчинами срібла нітрату і мангану (II) сульфату. Розчин, що досліджується, термостатують з важким магнієм оксидом при  $40^\circ C$ .






Паралельно за цих умов проводять реакцію з розчином еталону.




Сіре забарвлення паперу, одержане у досліді з випробуваним розчином, має бути не інтенсивнішим за забарвлення, одержане у досліді з еталоном.

### Арсен

**Метод А.** Грунтуються на відновлені арсену з його сполук цинком у кислому середовищі до газоподібного арсину:



Арсин, що виділився, вступає в реакцію з меркурієм бромідом (ртутно-бромідний папір), при цьому утворюється декілька продуктів:



Після промивання у воді та висушування на ртутно-бромідному папері залишається пляма від світло-жовтого ( $\text{AsH}_2(\text{HgBr})$ ) до темно-коричневого ( $\text{As}_2\text{Hg}_3$ ) кольору, інтенсивність якого залежить від концентрації домішки арсену.

Прилад для визначення домішки арсену за методом А наведений у ДФУ.




Визначення проводять у двох приладах: 1 – з випробуваною субстанцією; 2 – з еталонним розчином. Реакція відбувається у присутності розчину олова (II) хлориду, гранульованого цинку, кислоти хлористоводневої розведеного та розчину калію йодиду.

Для поглинання гідрогенсульфіду та сульфуру (IV) оксиду, які можуть утворитися в результаті реакції, нижню трубку приладу нещільно заповнюють ватою, просоченою розчином плumbуму (II) ацетату.


Температура водяної бані не повинна перевищувати 40 °С.

**Метод В.** застосовують у випадку визначення поряд з арсеном селену і телуру, а також при визначенні арсену в зразках, що містять стибій, вісмут, меркурій і срібло, а також сульфіди і сульфіти, та в деяких інших випадках.

Дослідження базується на відновленні сполук арсену натрію гіпофосфітом у присутності кислоти хлористоводневої концентрованої та калію йодиду до металевого миш'яку:




Процес відновлення арсену відбувається у дві стадії:



Після нагрівання на водяному нагрівнику забарвлення випробуваного розчину має бути не інтенсивнішим за забарвлення еталону.

### **Кальцій $\text{Ca}^{2+}$**


Визначають за реакцією з розчином амонію оксалату в оцтовокислому середовищі в присутності еталонного розчину кальцію спиртового:



Опалесценція випробуваного розчину не повинна перевищувати опалесценцію в досліді з еталоном.



### **Магній $\text{Mg}^{2+}$**

Визначення домішки магнію проводять у лужному середовищі взаємодією з розчином гідроксихіноліну в хлороформі – жовто-зелене забарвлення випробуваного розчину не повинне перевищувати забарвлення еталону:



### Плюмбум $Pb^{2+}$ та важкі метали

Визначення домішки важких металів проводять взаємодією з тіоацетамідним реагентом за певною методикою в залежності від того, яку природу має досліджувана речовина:



Коричневе забарвлення випробуваного розчину має бути не інтенсивнішим за забарвлення еталону. Порівняно з холостим розчином еталон повинен мати світло-коричневе забарвлення.

### Залізо $Fe^{3+}$


Визначають за реакцією з розчином тіогліколевої кислоти у присутності кислоти лимонної і розчину амоніаку:



Рожеве забарвлення випробуваного розчину має бути не інтенсивніше за забарвлення еталону.


### Калій $K^+$

Для визначення домішки калію використовують свіжоприготовлений розчин натрію тетрафенілборату – біла опалесценція випробуваного розчину не повинна перевищувати опалесценцію еталону:



### ***Алюміній $Al^{3+}$***

Визначення домішки алюмінію проводять з хлороформним розчином гідроксихіноліну – інтенсивність жовто-зеленої флуоресценції випробуваного розчину має не перевищувати флуоресценцію еталону:



### **Цинк $Zn^{2+}$**


Визначення домішки цинку проводять у кислому середовищі за реакцією з розчином калію фероціаніду:



Опалесценція випробуваного розчину не повинна перевищувати опалесценцію еталону.

### **Хлориди $Cl^-$**


Визначають за реакцією з розчином срібла нітрату у присутності кислоти нітратної розведеної:



Опалесценція випробуваного розчину не повинна перевищувати опалесценцію в досліді з еталоном.

### **Фосфати $PO_4^{3-}$**


Визначення домішки фосфатів проводять з сульфомолібденовим реактивом у присутності стануму (ІІ) хлориду в порівнянні з еталонним розчином фосфатів – сине забарвлення випробуваного розчину має бути не інтенсивнішим за забарвлення еталону:



В результаті реакції утворюється фосфорномолібденова кислота, яка відновлюється іонами  $\text{Sn}^{2+}$  до молібденової сині.

### Сульфати $\text{SO}_4^{2-}$

Визначають за реакцією з розчином барію хлориду у присутності кислоти оцтової та еталонного розчину сульфату спиртового:




Опалесценція випробуваного розчину не має перевищувати опалесценцію еталону.


### Фториди $\text{F}^-$

Випробування проводять у спеціальному приладі. Речовину змішують з піском (кремнію диоксидом), додають кислоту сульфатну розведену, нагрівають і збирають відгін у колбу, яка містить натрію гідроксид і фенолфталейн.

Паралельно проводять дослід з розчином еталону.

В циліндри з досліджуваним розчином і еталоном додають реактив – амінометилалізариндіоцтову кислоту – синє забарвлення, що з'являється замість червоного, має бути не інтенсивніше за забарвлення еталону:





### Тестові завдання за темою: «Випробування на граничний вміст домішок»

1. Левотироксин натріо – лікарський засіб, який використовують при гіпофункції щитоподібної залози. Для виявлення домішки хлоридів при випробуванні цього засобу необхідно використати розчин:
  - A. Срібла нітрату\*
  - B. Барію хлориду
  - C. Магнію сульфату
  - D. Міді (ІІ) сульфату
  - E. Заліза (ІІІ)хлориду
2. Фуросемід – лікарський засіб із групи петлевих діуретиків. При випробуванні цього засобу провели реакцію зі срібла нітратом у середовищі азотної кислоти розведеної. Поява білої опалесценції свідчить про присутність домішки:
  - A. Хлоридів\*
  - B. Кальцію
  - C. Магнію
  - D. Важких металів
  - E. Амонію солей
3. Провізор-аналітик проводить дослідження субстанції глюкози безводної. Для визначення домішки кальцію він проводить реакцію з розчином:
  - A. Амонію оксалату\*
  - B. Калію піроантимонату
  - C. Барію хлориду
  - D. Натрію гідроксиду
  - E. Натрію нітрату
4. При випробуванні аналгетичного засобу «Метамізол натрію моногідрат» провели реакцію з розчином барію хлориду в середовищі

оцтвою кислоти розведеної. Поява білої опалесценції свідчить про присутність домішки:

- A.** Сульфатів\*
- B.** Хлоридів
- C.** Кальцію
- D.** Важких металів
- E.** Амонію солей

**5.** Випробування субстанції кальцію лактату передбачає проведення реакції з розчином тіогліколевої кислоти у присутності лимонної кислоти і розчину аміаку. Ця реакція використовується для визначення такої домішки:

- A.** Заліза
- B.** Калію
- C.** Хлоридів
- D.** Сульфати
- E.** Амонію солей

**6.** До лабораторії фармацевтичного підприємства надійшла субстанція дилтіазему гідрохлориду. При цій випробуванні на наявність домішки важких металів необхідно використати такий реагент:

- A.** Тіоацетамідний\*
- B.** Мідно-тартратний
- C.** Молібдено-ванадієвий
- D.** Сульфомолібденовий
- E.** Ціанбромідний

**7.** Провізор-аналітик проводить аналіз субстанції натрію бензоат. Про наявність якої домішки в субстанції свідчить утворення білої опалесценції після додавання кислоти оцтової розведеної та розчину барію хлориду?

- A.** Сульфатів\*
- B.** Цинку
- C.** Фосфатів
- D.** Амонію
- E.** Магнію

**8.** Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить випробування на чистоту субстанції «Прокайн гідрохлорид» з тіоацетамідним реагентом. Утворення коричневого забарвлення свідчить про наявність домішки?

- A.** Важких металів\*
- B.** Калію
- C.** Алюмінію

- D.** Магнію  
**E.** Кальцію
- 9.** Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції кислоти аскорбінової згідно вимог ДФУ. Для визначення домішки кислоти щавлевої він використовує розчин:
- A.** Кальцію хлориду\*
  - B.** Натрію сульфату
  - C.** Натрію хлориду
  - D.** Натрію гідрокарбонату
  - E.** Натрію тіосульфату
- 10.** Для визначення домішки фторидів у лікарських сполуках провізор-аналітик проводить перегонку з водяною парою і потім визначає наявність натрію фториду реакцією з реагентом:
- A.** Амінометилалізаринової кислоти\*
  - B.** Метоксифенілоцтової кислоти
  - C.** Тіоацетамідним
  - D.** Роданбромуїдним
  - E.** Йодсірчистим
- 11.** На аналіз надійшов зразок води очищеної з аптеки. За допомогою якого реагенту можна виявити в ньому наявність важких металів?
- A.** Тіоацетамід\*
  - B.** Тіосемікарбазид
  - C.** Натрію нітропрусид
  - D.** 2,6-дихлорфенілінфенол
  - E.** Нінгідрин
- 12.** У якості основного реагтиву при випробуванні на граничний вміст домішки алюмінію хіміка-аналітик використовує розчин:
- A.** Гідроксихіноліну\*
  - B.** Бензальдегіду
  - C.** Піридину
  - D.** Резорцину
  - E.** Формальдегіду
- 13.** Провізор-аналітик визначає домішку заліза в лікарському засобі згідно вимог ДФУ. Про наявність цієї домішки свідчить поява такого забарвлення:
- A.** Зелене
  - B.** Блакитне
  - C.** Буре
  - D.** Рожеве\*
  - E.** Чорне
- 14.** Вода для ін'єкцій стерильна за вимогами ДФУ не повинна містити речовин, що окислюються. Який реагент (розчин) використовує провізор-

аналітик для виявлення цієї домішки?

- A. Амонію оксалат
- B. Заліза (ІІІ) хлорид
- C. Калію перманганат\*
- D. Барію хлорид
- E. Натрію гідроксид розведений

15. Провізор-аналітик проводить аналіз води очищеної. Для визначення домішки солей амонію у воді очищеної за вимогами ДФУ він використовує реактив:

- A. Сульфомолібденовий
- B. Фелінга
- C. Тіоацетаміду
- D. Реактив Нессслера\*
- E. Фішера

16. Провізор-аналітик визначає домішки солей амонію (метод А) в натрію тетрабораті згідно ДФУ за допомогою розчину:

- A. Калію тетрайодомеркурату\*
- B. Калію фероціаніду
- C. Натрію тетраборату
- D. Барію хлориду
- E. Срібла нітрату

17. Як основний реактив при випробуванні на граничний вміст домішки цинку хімік-аналітик використовує розчин:

- A. Калію фероціаніду\*
- B. Амонію тіоціанату
- C. Натрію сульфіду
- D. Срібла нітрату
- E. Барію хлориду

18. Для визначення домішки калію у лікарських сполуках провізор-аналітик проводить реакцію з:

- A. Натрію тетрафенілборатом\*
- B. Натрію нітратом
- C. Натрію тетраборатом
- D. натрію сульфатом
- E. натрію саліцилатом

19. Хімік ВТК фармацевтичного підприємства визначає доброкісність води очищеної. Який реактив йому необхідно використовувати для виявлення домішок нітратів і нітритів?

- A. розчин дифеніламіну\*
- B. розчин амонію оксалату
- C. розчин кислоти сульфосаліцилової
- D. розчин срібла нітрату
- E. розчин барію хлориду

**20.** Визначення домішки солей алюмінію в лікарських засобах проводять з розчином:


А. 8-гідроксихіноліну\*

В. Піридину  
С.  $\beta$ -нафттолу  
Д. етанолу  
Е. гідроксиламіну


#### 1.4. Визначення функціональних груп

##### Спиртовий гідроксил R-OH

**1.** Реакція естерифікації. При взаємодії спирту з карбоновою кислотою в присутності каталізатора (найчастіше кислоти сульфатної концентрованої) утворюється естер, який ідентифікують за запахом (найчастіше фруктові, залежить від природи радикалу) або за температурою плавлення:




**2.** Реакція окиснення. Продукти окиснення визначають за запахом, фізичними константами або продуктами подальших перетворень.




##### Фенольний гідроксил Ar-OH

**1.** Утворення комплексних сполук із солями важких металів (зазвичай заліза (ІІІ) хлорид). Будова та забарвлення комплексів можуть бути різними, залежно від кількості і положення в молекулі фенольних гідроксилів та інших хромоформних і ауксохромних груп.




**2.** Реакції заміщення в бензольному кільці:


- а) Бромування – при взаємодії з бромною водою утворюється білий осад:




б) Нітрування – при взаємодії з нітруючими агентами утворюються забарвлені продукти (суміш *o*- і *n*-похідних):



3. Індофенольна проба – реакція утворення індофенолового барвника синьо-фіолетового кольору при взаємодії фенолів з окисниками та деякими нітрогенвмісними речовинами ( $\text{NH}_3$ ,  $\text{NaNO}_2$  та ін.):




4. Реакція азосполучення – при взаємодії фенолів із солями діазонію утворюються азобарвники:



Азосполучення протікає в основному у *пара*- положенні до фенольного гідроксулу, якщо ж це положення зайняте, то відбувається *ортопозаміщення*.

5. Реакція з реактивом Маркі (розвчин формальдегіду з концентрованою сульфатною кислотою) утворюються ауринові барвники різного кольору:




Конденсація протікає в основному у *пара*-положення до фенольного гідроксилу, якщо ж це положення зайняте, то відбувається *ортого*-заміщення.

### **Меркаптогрупа R-SH, Ar-SH**


**1.** Тіоли з солями важких металів утворюють забарвлени осади. Наприклад з плюмбуму (II) ацетатом утворюється жовтий осад:




З розчином срібла нитрату утворюється білий осад:



**2.** Нітрозування. З етилнітритом підкисленим кислотою хлористоводневою у присутності диетилового етеру первинні та вторинні тіоли забарвлюють етерний шар у червоний колір, третинні – світло-зелений:



**3.** Окиснення. Тіоли знебарвлюють бромну воду окислюючись у дисульфіди:




### **Альдегідна група R-COH, Ar-COH**

**1.** Реакція «Срібного дзеркала». Відновлення срібла з аміачного розчину нітрату срібла (реактив Толленса):




**2.** Реакція з реактивом Фелінга. До розчину додають реактив Фелінга та нагрівають; поступово утворюється цегляно-червоний осад монооксиду міді:






**3.** Реакція з реактивом Несслера, в результаті якої утворюється металева ртуть:




Реакція дуже чутлива і часто використовується для виявлення домішки альдегідів.

**4.** Реакції заміщення оксигену:

a) Утворення забарвлених основ Шиффа при взаємодії з первинними ароматичними амінами (зазвичай живте, оранжеве забарвлення):




b) З гідразинами утворюються гідразони, які ідентифікують за температурою плавлення або забарвленням (зазвичай при  $\text{pH} > 7$  червоне забарвлення):




### Кетонна група $\text{R}-\text{C}(O)-\text{R}'$


**1.** Утворення оксиму (осад білого кольору) при взаємодії з гідроксиламіном гідрохлоридом:



2. Утворення гідразону (оранжево-червоне забарвлення) при взаємодії з 2,4-динітрофенілгідразоном:




3. Утворення гідразону (жовте забарвлення) при взаємодії з фенілгідразоном:




### Карбоксильна група R-COOH, Ar-COOH


1. Реакція з солями важких металів ( $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{CoCl}_2$  та ін.). Карбонові кислоти та їх солі з розчинами важких металів утворюють забарвлені розчини або осади. У випадку вільної карбоксильної групи її попередньо нейтралізують розчином натрію гідроксидом з індикатором фенолфталеїном до слабо рожевого забарвлення, після чого додають солі важкого металу:




2. Реакція утворення естерів. Невелику кількість кислоти або її солі розчиняють у воді, потім додають рівний об'єм сульфатної кислоти концентрованої та декілька крапель етанолу: при нагріванні з'являється фруктовий запах естера:



3. Реакція з розчином калію йодату і йодиду. В результаті реакції утворюється йод, який забарвлює розчин в жовтий колір, а при додаванні крахмалю – у синій колір:




4. При взаємодії з розчином натрію гідрокарбонату (на відміну від спиртів і фенолів) виділяється карбон (IV) оксид:



### Естерна група $R-C(O)-O-R'$


1. Гідроліз у лужному або кислому середовищі:



Продукти реакції визначають хімічними методами або за запахом чи фізичними константами.


2. Гідроксамова реакція. При взаємодії з гідроксиламіну гідрохлоридом утворюються безбарвні гідроксамові кислоти, які з солями заліза (ІІІ) хлоридом або міді (ІІ) сульфатом дають забарвлені комплекси (зазвичай з

заліза (ІІІ) хлоридом утворюються комплекси, які забарвлені в синювато-червоний або червоний колір):




### Первинна ароматична аміногрупа Ar-NH<sub>2</sub>

1. Реакція утворення основи Шиффа:




Різновидом цієї реакції є «Лігнінова проба». Лігнінова проба. Використовується для експрес-аналізу. Проводять на деревині або на невибіленому газетному папері, при нанесенні які сульфаниламіду або іншої речовини з первинною ароматичною аміногрупою ц краплі хлороводневої кислоти з'являється оранжево-червоне забарвлення. У результаті гідролізу лігніну утворюються ароматичні альдегіди, які реагують з первинною ароматичною аміногрупою з утворенням основ Шиффа

2. Реакція діазотування з наступним азосполученням. За цих умов утворюються азобарвники. Первинні ароматичні аміни з розчином натрію нітриту у присутності кислоти хлористоводневої розведеної, утворюють солі діазонію. При подальшому додаванні розчину β-нафттолу з'являється інтенсивне оранжеве або червоне забарвлення (від оранжевого до фіолетового до синього) і, як правило, утворюється осад такого ж самого кольору:



3. Реакція з бромною водою. Розчин бромної води знебарвлюється та утворюються білі осади бромзаміщених ароматичних амінів, які ідентифікують за температурою плавлення:



### Тестові завдання за темою: «Визначення функціональних груп»

1. Згідно з вимогами ДФУ для ідентифікації етанолу використовують реакцію з калій перманганатом у середовищі розбавленої сульфатної кислоти. Що є продуктом окиснення етанолу?

- A. Ацетальдегід\*
- B. Ацетон
- C. Ацетилен
- D. Діетиловий ефір
- E. Ацетатно-етиловий ефір

2. З метою ідентифікації провізор-аналітик нагрів субстанцію етанолу з ацетатною кислотою розбавленою за наявності концентрованої кислоти сульфатної; з'являється приємний фруктовий запах. Про утворення якої речовини це свідчить?

- A. Етилацетату\*
- B. Ацетону
- C. Ацетилену
- D. Етилену

**E. Ацетальдегіду**

**3.** Наявність фенольного гідроксилу в молекулі парацетамолу можна підтвердити реакцією комплексоутворення з:

- A.**  $\text{FeCl}_3$
- B.**  $\text{HCl}$
- C.**  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
- D.**  $\text{K}[\text{BiI}_4]$
- E.**  $\text{NH}_2\text{OH}$

**4.** Для ідентифікації субстанції фенолу згідно з вимогами ДФУ мпеціаліст Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить реакцію окиснення в амоніачному середовищі. Назвіть сполуку, що утворилася.

- A.** Індофенольний барвник\*
- B.** Азобарвник
- C.** Азометиловий барвник
- D.** Ауриновий барвник
- E.** Комплексна сіль

**5.** Лікарський засіб тимол має у структурі фенольний гідроксил і тому легко окиснюється. Для ідентифікації тимолу можна використовувати індофенольну

пробу. Доберіть реактиви для проведення цієї реакції.

- A.** Розчин хлораміну та розчин амоніаку\*
  - B.** Розчин хлористоводневої кислоти
  - C.** Розчин сульфатної кислоти та формальдегіду
  - D.** Розчин йоду та розчин натрій гідроксиду
  - E.** Розчин сульфатної кислоти та розчин брому
- 6.** Лікарські засоби, які мають у структурі фенольний гідроксил, вступають у реакцію електрофільного заміщення. Назвіть реакцію, яку можна застосовувати як для ідентифікації резорцину, так і для його кількісного визначення.
- A.** Бромування\*
  - B.** Сульфування
  - C.** Нітрування
  - D.** Алкілювання
  - E.** Гідроксиметилювання
- 7.** Ідентифікацію піридоксину гідрохлориду (ДФУ) спеціаліст Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить методом


тонкошарової хроматографії.

Для проявлення хроматограми він застосовує реакції утворення індофенольного барвника.

Назвіть необхідний реагент.

- A. Дихлорхінонхлорамід\*
- B. Калію йодбісмутат
- C. Калію нітрат
- D. Динітробензальдегід
- E. Натрію кобальтинітрит

8. Назвіть у молекулі естрадіолу пропіонату функціональні групи:



- A. Фенольний гідроксил, естерна група\*
- B. Спиртовий гідроксил, кетогрупа
- C. Енольний гідроксил, карбоксильна група
- D. Фенольний гідроксил, етоксигрупа
- E. Спиртовий гідроксил, естерна група

9. У структурі молекули лікарського засобу міститься естерна група. Для

підтвердження її наявності в лікарському засобі провізор-аналітик використовує:

- A. Гідроксамову пробу\*
- B. Пробу Ле-Розена
- C. Мурексидну пробу
- D. Пробу Бейльштейна
- E. Індофенольну пробу

10. Провізор-аналітик проводить випробування на чистоту субстанції ефіру для наркозу. Однією з недопустимих домішок у субстанції є альдегіди. Для виявлення вмісту домішки альдегідів згідно з вимогами ДФУ він проводить реакцію з реактивами:

- A. Калію тетрайодмеркурату лужний розчин\*
- B. Амонію оксалат, амонію хлорид
- C. Хлоридна кислота, хлороформ
- D. Натрію гідрофосфат, хлоридна кислота
- E. Натрію гідроксид, натрію карбонат

11. Лікарські засоби, що містять у структурі альдегідну групу, легко окиснюються, тому

наявність альдегідної групи у молекулах лікарських субстанцій можна виявити, використовуючи реактиви:

A. Фелінга, Толленса, Несслера\*

B. Маркі, Марме, Майєра

C. Люголя, Вагнера, Бушарда

D. Драгендорфа, Зонненштейна, Шейблера

E. Шейблера, Фелінга, Бертрана

12. Студенту фармацевтичного факультету потрібно підтвердити наявність кетогрупи у субстанції преднізолону. Який реактив необхідно використати?

A. Фенілгідразину сульфат\*

B. Аргентуму нітрат

C. Натрію нітрат

D. Барію сульфат

E. Амонію молібдат

13. Про наявність якої групи свідчить позитивна реакція «срібного дзеркала» у структурі лікарського засобу?

A. Альдегідної\*

B. Амідної

C. Естерної

D. Карбоксильної

E. Нітрогрупи

14. Аналітик Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів досліджує якість калію ацетату. Після додавання до розчину калію ацетату відповідних реагентів утворюється сполука, котру виявляють за запахом. Які реактиви додав аналітик для проведення реакції?

A.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (конц.)\*

B.  $\text{CH}_3\text{OH}$ ,  $\text{HCl}$

C.  $\text{NaOH}$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$

D.  $\text{HCl}$ ,  $\text{C}_2\text{H}_4$

E.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ,  $\text{NaOH}$

15. Для підтвердження наявності карбоксильної групи в кислоті нікотиновій провізор-аналітикgotus розчин:

A. Купруму сульфату\*

B. Барію сульфату

C. Натрію нітрату

D. Калію перманганату

E. Брому

16. Первинну ароматичну аміногрупу в молекулі сульфометоксазолу згідно з

вимогами ДФУ виявляють за допомогою таких реагентів:

- A.  $\text{NaNO}_2$ ,  $\text{HCl}$ , лужний розчин  $\beta$ -нафтолу\*
- B.  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{HCl}$ , лужного розчину гідроксиламіну
- C.  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{HCl}$ , лужного розчину калію тетрайодмеркурату
- D.  $\text{NaNO}_2$ ,  $\text{NaOH}$ , лужного розчину  $\beta$ -нафтолу
- E.  $\text{KMnO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , лужного розчину  $\beta$ -нафтолу

17. Провізор-аналітик здійснює ідентифікацію субстанції тримекайну гідрохлориду після попереднього лужного гідролізу. Одним із продуктів гідролізу є 2,4,6-триметиланілін, що можна підтвердити за допомогою реакції утворення:

- A. Азобарвника\*
- B. Талейохіну
- C. Флуоресцеїну
- D. Ауринового барвника
- E. Мурексиду

18. Для визначення якої функціональної групи згідно з вимогами ДФУ використовують такі реактиви: кислота

хлористоводнева розведена, розчин натрію нітрату,  $\beta$ -нафтолу розчин лужний?

- A. Аміни ароматичні первинні\*
- B. Фенольний гідроксил
- C. Спиртовий гідроксил
- D. Естерна група
- E. Альдегідна група

19. Однією з реакцій ідентифікації стрептоциду, яку використовують в експрес-аналізі лікарських форм, виготовлених в умовах аптеки, є лігнінова проба. Ця реакція підтверджує наявність у молекулі субстанції такої функціональної групи:

- A. Первальної ароматичної аміногрупи\*
- B. Первинного спиртового гідроксилу
- C. Заміщеної сульфамідної
- D. Естерної
- E. Етерної

20. Провізор-аналітик лабораторії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів проводить ідентифікацію субстанції мерказолілу, у

структурі якого є меркаптогрупа, за реакцією з розчином:

- A. Срібла нітрату\*
- B. Натрію нітрату
- C. Натрію хлориду
- D. Калію перманганату
- E. Гідроген пероксиду

21.Із реакцій ідентифікації лікарського засобу виберіть реакцію, що зумовлена наявністю сульфогрупи:

- A. Утворення нерозчинної солі барію\*
- B. Утворення естера
- C. Утворення оксонієвої солі
- D. Утворення ауринового барвника
- E. Утворення індофенольного барвника

22.Лікарський засіб містить амінометиленсульфонатну групу. За наявністю цієї групи провізор-аналітик проводить ідентифікацію. Назвіть продукти

реакції, що утворюються при розкладанні лікарського засобу мінеральними кислотами:

- A. Формальдегід, сульфуру (IV) оксид\*
- B. Сульфатна кислота, метиламін
- C. Сульфатна кислота, метан
- D. Гідрогенсульфід, метиламін
- E. Диметиламін, гідрогенсульфід


23.Із реакцій ідентифікацій сульфадиметоксину виберіть реакцію, зумовлену наявністю сульфамідної групи:

- A. Взаємодія з солями міді та кобальту\*
- B. Утворення азобарвника
- C. Утворення азометинового барвника
- D. Утворення естера
- E. Утворення індофенольного барвника

## ІІ. ЗАГАЛЬНООСАДЖУВАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ АЛКАЛОЇДНІ РЕАКТИВИ


### Загальноалкалоїдні осаджуvalльні реактиви

- ✓ Реактив Люголя/Вагнера/Бушарда  $K[I_3]$  ( $I_2 \cdot KI$ ) – зазвичай бурі осади;
- ✓ Реактив Драгендорфа  $K[BiI_4]$  – зазвичай оранжеві осади;
- ✓ Реактив Майєра  $K_2[HgI_4]$  – зазвичай білі осади;
- ✓ Реактив Марме  $K_2CdI_4$  – зазвичай білі осади;
- ✓ Реактив Зонненштейна  $H_3PO_4 \cdot 12MO_3$  – зазвичай жовті осади;
- ✓ Реактив Бертрана  $2SiO_2 \cdot 12WO_3$  – зазвичай пофарбовані розчини або осади;
- ✓ Реактив Шейблера  $H_3PO_4 \cdot 12WO_3$  – зазвичай біло-жовті осади;
- ✓ Реактив Рейнеке  $(NH_4)_2[Cr(SCN)_4]$  – зазвичай бузкові осади;
- ✓ Сіль Рейнеке  $NH_4[Cr(NCS)_4(NH_3)_2] \cdot H_2O$  (тетрараданодiamінхроміат амонію);
- ✓ Пікрінова кислота  $HO-C_6H_2-(NO_2)_3$  – зазвичай білі або жовті осади:



### Спеціальні реактиви


- ✓ Кислота азотна концентрована  $HNO_3$ ;
- ✓ Кислота сульфатна концентрована  $H_2SO_4$ ;
- ✓ Реактив Ердмана (суміш концентрованих кислот - азотної та сульфатної  $HNO_3 + H_2SO_4$ );
- ✓ Реактив Манделіна (розчин  $(NH_4)_2VO_3$  у кислоті сірчаної конц.);
- ✓ Реактив Фреде (розчин  $(NH_4)_2MoO_3$  у кислоті сірчаної конц.);
- ✓ Реактив Маркі (розчин формальдегіду в кислоті сульфатній конц.  $HCOH + H_2SO_4$ );
- ✓ Реактив Вазицький (*n*-диметиламінобензальдегід):




### ІІІ. ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

#### 3. Нестероїдні протизапальні засоби

##### 3.1. Натрію саліцилат




**Добування.** Взаємодією кислоти саліцилової з натрію гідрокарбонатом або еквівалентною кількістю натрію гідроксиду.




**Властивості:** кристалічний порошок білого кольору, або дрібні безбарвні пристали, або блискучі пластівці. Легкорозчинний у воді, помірно розчинний у 96 %-му спирті.

##### Ідентифікація:

1. ІЧ-спектроскопія.
2. З розчином феруму (ІІІ) хлориду утворюється фіолетове забарвлення, яке не зникає після додавання оцтової кислоти:




3. З розчином хлористоводневої кислоти утворюється білий осад саліцилової кислоти, яку ідентифікують за температурою плавлення (159°C):




4. Субстанція дає реакції на катіон натрію.

## Кількісне визначення:





1. Ацидиметрія у неводному середовищі, пряме титрування, індикатор – нафтолбензейн:




2. Ацидиметрія, пряме титрування в присутності ефіру для екстракції бензойної кислоти, яка може впливати на pH розчину і змінювати забарвлення індикатора раніше точки еквівалентності, індикатор – суміш метилового оранжевого і метилового синього:




3. Броматометрія, зворотне титрування, індикатор – крохмаль:



## Метаболізм:




### 3.2. Кислота ацетилсаліцилова




**Добування:**


1. Ацетилування кислоти саліцилової оцтовим ангідридом:



2. Ацетилування саліцилової кислоти оцтовою кислотою в присутності фосфору трихлориду:



3. Взаємодією саліцилової кислоти з кетеном:




**Властивості:** кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали. Лікарський засіб стійкий у сухому повітрі, у вологому поступово гідролізується з утворенням оцтової і саліцилової кислот. Малорозчинний у воді, легкорозчинний у 96 %-му спирті, розчинний в ефірі, розчинах гідроксидів та карбонатів лужних металів.


### Ідентифікація:

1. ІЧ-спектроскопія.


2. Взаємодія з сульфатною кислотою розведеною, після лужного гідролізу. Спостерігається утворення білого кристалічного осаду саліцилової кислоти, який ідентифікують за температурою плавлення:




2.1. Реакційну суміш фільтрують, до фільтрату додають спирт і сульфатну кислоту концентровану. Утворюється оцтовоетиловий естер, який має характерний фруктовий запах:




2.2. Саліцилову кислоту, що міститься в осаді, ідентифікують з розчином феруму (III) хлориду за появою фіолетового забарвлення:




3. При прожарюванні з кальцію гідроксидом утворюється ацетон, пари якого забарвлюють фільтрувальний папір, змочений *o*-нітробензальдегідом, у жовто-зелений, блакитно-зелений:




А при змочуванні розчином хлористоводневої кислоти – блакитний колір:



4. При додаванні сульфатної кислоти концентрованої з'являється запах оцтової кислоти.






Якщо потім до суміші додати розчин формальдегіду, виникає рожеве забарвлення:




### Кількісне визначення:



1. Алкаліметрія, зворотне титрування. Метод Ґрунтується на омиленні субстанції розчином гідроксиду натрію, надлишок якого відтитровують хлористоводневою кислотою. Індикатор – фенолфталейн.






2. Алкаліметрія, пряме титрування в нейтралізованому за фенолфталейном спирті:




3. Броматометрія після гідролізу:






### 3.3. Метамізолу натрієва сіль (Анальгін)



**Добування:** Синтезують взаємодією монометиламіноантіпіруну з сумішшю натрію бісульфіту та формальдегіду:




**Властивості:** Білий або білий з жовтуватим відтінком кристалічний або голковий порошок. Гігроскопічний, у присутності водоги розкладається, легко розчинний у воді (1:1,5), важко – у спирті. Водні розчини (pH 6,0-7,5) безбарвні, при зберіганні жовтіють, але не втрачають своєї активності.


#### Ідентифікація:

1. ІЧ-спектроскопія.

2. Субстанція з розчином гідрогену пероксиду концентрованого (або з іншими окисниками) дає синє забарвлення, яке швидко зникає і через декілька хвилин переходить в інтенсивне-червоне.




3. Підкислений розчин субстанції обережно нагрівають. Пробірку накривають фільтрувальним папером, змоченим розчином калію йодату та розчином крохмалю:





Пари сульфуру (IV) оксиду, що виділяються, забарвлюють фільтрувальний папір у синій колір:




Формальдегід, що виділяється, з розчином натрієвої солі кислоти хромотропової у кислоті сульфатній дає синьо-фіолетове забарвлення:




4. Субстанція дає реакції на натрій.
5. Нефармакопейна реакція. Підкислений спиртовий розчин субстанції при додаванні розчину калію йодату забарвлюється в малиновий колір (проміжні продукти окиснення), а при подальшому додаванні реактиву забарвлення посилюється і виділяється бурий осад йоду:




**Кількісне визначення.** Йодометрія, пряме титрування, індикатор – крохмаль. Підкислений розчин субстанції титрують розчином йоду до появи блакитного забарвлення, що не зникає протягом 2 хв. Температура розчину у процесі титрування не повинна перевищувати 10°C:




**Метаболізм.** У травному тракті анальгін гідролізується в 4-метиламіноантіпірин (МАА) та абсорбується у цій формі. Далі МАА метаболізується до 4-форміламіноантіпірину (ФАА), який є кінцевим метаболітом, а також – до 4-аміноантіпірину (АА). АА ацетилюється до 4-ацетиламіноантіпірину (AAA).



### 3.4. Бутадіон (Фенилбутазон)




**Добування:** Конденсацією *n*-бутилмалонового естера з гідразобензолом у присутності натрію етилату:




**Властивості:** Білий або з блідо-жовтим відтінком кристалічний порошок. Практично нерозчинний у воді, важко - у спирті, розчинний у розчині натрію гідроксиду.

### Ідентифікація:


1. Визначення температури плавлення – 104 – 107 °C.
2. ГЧ-спектроскопія.
3. ТШХ.
4. Після нагрівання субстанції із сумішшю кислот оцтової і хлористоводневої концентрованих додають натрію нітрит – з'являється жовте забарвлення:




До одержаного розчину додають лужний розчин  $\beta$ -нафтолу; спостерігається випадіння коричнево-червоного осаду:




5. При окисненні розчином натрію нітриту в кислоті сульфатний концентрований з'являється оранжеве забарвлення, яке переходить у вишневе. Одночасно спостерігається виділення бульбашок газу. В жорстких умовах бутадіон як похідна гадразобензолу окислюється до похідних азобензолу:




6. З розчином солей важких металів субстанція утворює нерозчинні забарвлені солі. Після нейтралізації гідроксидами лужних металів бутадіон з розчином купруму (ІІ) сульфату дає осад сіруватого кольору, який переходить у блідно-голубий:




**Кількісне визначення.** Алкаліметрія в середовищі ацетону, пряме титрування, індикатор – фенолфталейн:



### 3.5. Парацетамол (Ацетамінофен)




**Добування:** Фенол нітрозують натрію нітритом у кислому середовищі. Утворений *n*-нітрозофенол відновлюють гідрогенсульфідом в аміачному середовищі до *n*-амінофенолу, який ацетилують:




**Властивості:** Білий чи білий з кремовим або рожевим відтінком кристалічний порошок. Легкорозчинний у спирті, нерозчинний у воді.

### Ідентифікація:


1. Температура плавлення – 169 °C.
2. УФ-спектроскопія.
3. ІЧ-спектроскопія.
4. При кислотному гідролізі утворюється п-амінофенол, який окиснюється калію дихроматом до індофенолу фіолетового кольору, що не переходить у червоний:




5. Субстанція дає реакції на ацетил.
6. Нефармакопейні реакції:
  - 6.1.3 розчином феруму (III) хлориду утворюється синьо-фіолетове забарвлення:



**6.2.** Наявність у молекулі фенольного гідроксулу зумовлює реакцію парацетамола із солями діазонію – утворюється азобарвник червоного кольору:




**6.3.** Реакція утворення азобарвника після кислотного гідролізу (реакція на первинну ароматичну аміногрупу) – утворюється азобарвник фіолетового кольору:




### Кількісне визначення:


1. Цериметрія після попереднього кислотного гідролізу. Утворений *n*-амінофенол титують розчином церію (IV) сульфату, індикатор – фероїн. Паралельно проводять контрольний дослід:






2. Нітратометрія після гідролізу лікарської речовини, пряме титрування, індикатор – йодокрохмальний папір:




Точку еквівалентності визначають за посинінням йодокрохмального паперу від надлишкової краплі титранту:




3. Алкаліметрія, пряме титрування після кислотного гідролізу, індикатор – фенолфталеїн. Паралельно проводять контрольний дослід:




**Метаболізм:** До 80% парацетамолу метаболізується мікросомальними ферментами печінки шляхом глюкуронування та сульфування. Невелика кількість парацетамолу деацетилюється з утворенням п-амінофенолу, який, в свою чергу, в організмі здатний окиснюватись до хіононіму. Останній є каталізатором перетворення гемоглобіну у метгемоглобін, що призводить до гепатотоксичної та нефротоксичної дії. У незмінному вигляді із сечею виводиться тільки 3% препарату.



### 3.6. Натрію диклофенак (Вольтарен)





**Добування:** Синтезують з 2-хлорбензойної кислоти та 2,6-дихлораніліна у присутності калію гідроксиду та міді з послідуючим відновленням карбоксильної групи літію алюмогідридом. Далі піддають хлоруванню тіонілхлоридом. Додають натрію ціанід. Лужним гідролізом нітрильної групи отримують натрію диклофенак:



**Властивості:** Від білого з кремовим відтінком до світло-кремового кольору кристалічний порошок без запаху. Мало розчинний у воді, легко – в етанолі та метанолі, практично нерозчинний в хлороформі.

### Ідентифікація:


1. ІЧ-спектроскопія.
2. ТПХ.
3. Реакція окиснення. Реакція на похідні дифеніламіну. З розчином калію ферицианіду і розчином феруму (ІІІ) хлориду у присутності кислоти хлористоводневої поступово з'являється синє забарвлення і утворюється синій осад (берлінська лазур):



4. Субстанція дає реакції на натрій.


## Кількісне визначення. Ацидиметрія в неводному середовищі.

Потенціометрично.



**Метаболізм.** ДН піддається практично повної метаболізації в організмі людини, лише близько 1% речовини виділяється у незміненому вигляді. Даний НПЗЗ у I фазі метаболізму гідроксилюється цитохромом P450-залежними оксигеназами (CYP), а у II фазі кон'югується з глюкуроновою кислотою та амінокислотою таурин.

У II фазі метаболізму утворюються глюкуронідні та сульфатні кон'югати ДН, частка яких становить 11 % від спожитої дози. 88% спожитої дози ДН, що залишилися, виводяться у вигляді метabolітів або їх кон'югатів.



## Тестові завдання за темою: «Нестероїдні протизапальні засоби»

1. Парацетамол – лікарський засіб, що чинить аналгетичну, жарознижувальну та протизапальну дію. При кількісному визначенні діючої речовини цериметричним методом як індикатор використовують:
- A. Фероїн\*
  - B. Натрію еозинат
  - C. Фенолфталейн
  - D. Крохмаль
  - E. Калію хромат
2. Парацетамол – лікарський засіб, що чинить аналгетичну, жарознижувальну та протизапальну дію. Реакція ідентифікації з розчином заліза (ІІІ) хлориду обумовлена наявністю в його структурі:
- A. Фенольного гідроксилу\*
  - B. Ароматичної нітрогрупи
  - C. Естерної групи
  - D. Альдегідної групи
  - E. Карбоксильної групи
3. Проводиться експрес-аналіз рідкої лікарської форми, що містить натрію саліцилат і натрію бензоат. Для виявлення саліцилат- та бензоат-іонів при сумісній присутності необхідно використати розчин:
- A. Заліза (ІІІ) хлориду\*
  - B. Калію йодиду
  - C. Натрію нітрату
  - D. Амонію хлориду
  - E. Алюмінію сульфату
4. Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) належить до групи нестероїдних протизапальних засобів. Її кількісне визначення методом прямої алкаліметрії рекомендується проводити за температури не вище 20 °C з метою запобігання:
- A. Гідролізу естерної групи\*
  - B. Відновлення лікарської речовини
  - C. Окиснення лікарської речовини
  - D. Декарбоксилювання лікарської речовини
  - E. Осадження солі, що утворюється
5. При ідентифікації субстанції ацетилсаліцилової кислоти (аспірин) проводять її гідроліз. Який реактив використовують

для виявлення одного з

продуктів гідролізу?

- A. Заліза (ІІІ) хлорид\*
- B. Натрію гідротартрат
- C. Магнію сульфат
- D. Амонію оксалат
- E. Натрію гідрокарбонат

6. Вкажіть продукт взаємодії парацетамолу з кислотою хлористоводневою та наступним додаванням калію дихромату:

- A. Індофеноловий барвник\*
- B. Ауриновий барвник
- C. Трифенілметановий барвник
- D. Азобарвник
- E. Основа Шиффа

7. Кількісне визначення якого лікарського засобу методом нітратометрії вимагає попереднього гідролізу?

- A. Парацетамол\*
- B. Анестезин
- C. Прокайн гідрохлорид
- D. Натрію парааміносаліцилат
- E. Дикаїн

8. На аналіз надійшла субстанція анальгіну. Оберіть метод, за допомогою якого можна

визначити кількісний вміст анальгіну:

- A. Йодометрія\*
- B. Ацидиметрія
- C. Алкаліметрія
- D. Комплексонометрія
- E. Перманганатометрія

9. Фенілсаліцилат

(Phenylisalicylas) можна ідентифікувати по запаху фенолу, який виділиться при додаванні до препарату:

- A.  $H_2SO_4^*$
- B. NaCl
- C.  $CuSO_4$
- D.  $AgNO_3$
- E.  $CoCl_2$

10. Провізор-аналітик виконує аналіз натрію диклофенаку. Вкажіть метод його кількісного визначення згідно вимог ДФУ:

- A. Ацидиметрія у безводному середовищі\*
- B. Алкаліметрія у спиртово-хлороформній суміші
- C. Алкаліметрія у водному середовищі
- D. Алкаліметрія у безводному середовищі

**E. Ацидиметрія у водному середовищі**

**11.** Принцип салолу був сформований Ненцьким і широко використовується при розробці лікарських засобів, що утворюють в процесі біотрансформації два активні інгредієнти. Салол в результаті метаболізму утворює фенол та саліцилову кислоту. Його міжнародною назвою є:

- A. Фенілсаліцилат\***
- B. Ацетамінофен**
- C. Хлорамфенікол**
- D. Дифенгідрамін**
- E. Фталілсульфатіазол**

**12.** Фенілсаліцилат – класичний представник проліків. Він гідролізується в кишечнику і утворює такі сполуки:

- A. Саліцилова кислота та фенол\***
- B. Амінобензойна кислота та етанол**
- C. Бензойна кислота та метанол**
- D. Ізовалеріанова кислота та ментол**

**E. Нікотинова кислота та діетиламін**

**13.** Оптимальним для всмоктування основного метаболіту ацетилсаліцилової кислоти є кисле середовище. Назвіть цей метаболіт:

- A. Саліцилова кислота\***
- B. Барбітурова кислота**
- C. Фенілоцтова кислота**
- D. Сечова кислота**
- E. Вальпроєва кислота**

**14.** Одним з напрямком біотрансформації парацетамолу в печінці є окиснення мікросомальними ферментами. У результаті утворюється токсичний метаболіт:

- A. Хіонімін\***
- B. Фенол**
- C. o-ксилол**
- D. Фталевий ангідрид**
- E. m-діоксибензол**

**15.** Хімік-аналітик ідентифікує парацетамол реакцію на фенольний гідроксил, в результаті якої утворюється синьо-фіолетове забарвлення. Який реагент він використав?

- A. Заліза (ІІІ) хлорид\***

- B.** Натрію хлорид  
**C.** Калію піроантимонат  
**D.** Барію хлорид  
**E.** Срібла нітрат
- 16.** Парацетамол відноситься до нестероїдних протизапальних засобів і в організмі біотрансформується шляхом деацетилювання. Який метаболіт утворюється?
- A.** *n*-амінофенол\*  
**B.** Амінобензол  
**C.** *o*-ксилол  
**D.** Нітробензол  
**E.** *m*-діоксибензол
- 17.** Провізор-аналітик проводить реакції ідентифікації парацетамолу. Який розчин він використовує для визначення ацетилу?
- A.** Лантану нітрату\*  
**B.** Магнію сульфату  
**C.** Натрію сульфіду  
**D.** Калію дихромату  
**E.** Амонію оксалату
- 18.** Диклофенак натрію належить до нестероїдних протизапальних засобів. Який метод використовують для його кількісного визначення?
- A.** Ацидиметрія в неводному середовищі\*  
**B.** Зворотна броматометрія  
**C.** Алкаліметрія за замісником  
**D.** Зворотна аргентометрія  
**E.** Пряма йодометрія
- 19.** Аналітик контрольно-аналітичної лабораторії виконує експрес-аналіз натрію парааміносаліцилату. Наявність фенольного гідроксиду підтверджується реакцією з розчином:
- A.**  $\text{FeCl}_3^*$   
**B.**  $\text{NH}_3$   
**C.**  $\text{AgNO}_3$   
**D.**  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$   
**E.** Концентрованої  $\text{HNO}_3$
- 20.** В результаті реакції аналгетичного засобу «Метамізол натрію моногідрат» із розчином калію піроантимонату утворився білий осад. Це підтверджує наявність в структурі лікарської речовини:
- A.** Іонів натрію\*  
**B.** Ковалентно зв'язаної сірки  
**C.** Метильних груп  
**D.** Фенільного радикалу


## **E. Кетогрупи**

### **Ситуаційні задачі за темою: «Нестероїдні протизапальні засоби»**


- 1.** Визначити масову частку кислоти саліцилової (М.м. 138,12) в лікарському засобі, якщо на титрування наважки 0,2675 г витрачено 19,59 мл 0,1 Н розчину натрій гідроксиду (КП = 0,9876).
- 2.** Визначити масову частку натрію саліцилату (М.м. 160,11) в лікарському засобі, якщо на титрування наважки 1,5668 г натрію саліцилату витрачено 17,38 мл 0,5 Н розчину хлоридної кислоти (КП = 1,1218).
- 3.** Визначити масу наважки кислоти саліцилової (М.м. 138,12) якщо на її титрування буде витрачено 19,34 мл 0,1 Н розчину натрій гідроксиду (КП – 0,9936). А її відсотковий вміст в лікарському засобі – 99,20%.
- 4.** Визначити масу наважки метамізолу натрієвої солі (М.м. = 333,36), якщо на її титрування буде витрачено 11,95 мл 0,1 М розчину йоду (КП = 0,9956), відсотковий вміст метамізолу натрієвої солі в лікарському засобі – 99,00%.
- 5.** Визначити об'єм 0,1 Н розчину натрій гідроксиду (КП=0,9894), який буде витрачено на титрування 0,6220 г кислоти ацетилсаліцилової (М.м. 180,16), якщо її відсотковий вміст в лікарському засобі – 99,88%.

## **4. НАРКОТИЧНІ АНАЛЬГЕТИКИ**

### **4.1. Морфіну гідрохлорид**




**Добування.** В основі синтезу морфіну виступає – 2,6-дигідроксинафталін.




**Властивості:** Білий кристалічний порошок, що жовтіє при зберіганні; розчинний у воді, гліцерині, малорозчинний в етанолі.  $T_{\text{пл.}} = 130 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### Ідентифікація:


- Субстанція дає реакцію хлориди.
- З реактивом Фреде ( $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{MoO}_3$ ) утворюється фіолетове забарвлення.




- При додаванні аміаку випадає білий кристалічний осад, який розчиняється в розчині натрію гідроксиду.




- З реактивом Марки утворюється пурпурне забарвлення, яке перетворюється на синьо-фіолетове.




5. Реакція на фенольний гідроксил. З розчином феруму (III) хлориду утворюється синє фарбування.



6. Реакція утворення азобарвника червоно-фіолетового кольору.




7. Взаємодія з реактивом Ердмана ( $\text{HNO}_3$  conc. +  $\text{H}_2\text{SO}_4$  conc.), утворюється інтенсивно-червоне фарбування.



### Кількісне визначення.


1. Ацидиметрія у неводному середовищі у присутності ртуті (II) ацетату.  
Індикатор – кристалічний фіолетовий.




## 2. Аргентометрія методом Фольгарда.

**Метаболізм.** В організмі морфін здебільшого метаболізується з утворенням кон'югату з глюкуроновою кислотою (глюкуронід), частина морфіну N-деметилується до норморфіну та про-метилюється до кодеїну.

Морфін-6-глюкуронід (M6G) - основний активний метаболіт морфіну, багато в чому відповідальний за знеболювальні ефекти морфіну.




## 4.2. Кодеїн. Кодеїну фосфат.




### Добування:

- Кодейн отримують селективним метилуванням морфіну.



- Одержання селективним метилуванням гідроксильної групи за допомогою етилату триметилфеніламонію.




**Властивості:** Білий кристалічний порошок або безбарвні кристали, розчинний у гарячій воді, легкорозчинний у спирті, розчинний в ефірі.  $T_{\text{пл.}}$  — 155–159 °C.


### Ідентифікація:

- УФ-спектроскопія.
- ІЧ-спектроскопія.


- Субстанція дає реакцію фосфати.
- Кодеїну фосфат визначають за температурою плавлення основи – 154 – 157 °C.
- При нагріванні з сульфатною кислотою концентрованою та розчином феруму (ІІІ) хлоридом утворюється синє забарвлення, яке переходить у червоне при додаванні однієї краплі азотної кислоти концентрованої.



- З реактивом Марки утворюється синьо-фіолетове забарвлення, яке посилюється при стоянні.




- З азотною кислотою концентрованою утворюється оранжеве забарвлення.




**Кількісне визначення.**


1. Ацидиметрія у неводному середовищі у присутності ледяної оцтової кислоти та діоксину. Титрант – розчин перхлоратної кислоти. Індикатор – кристалічний фіолетовий.




2. Кодеїн, як сильна основа, можна визначити ацидиметрично у водно-спиртовому середовищі, індикатор – метиленовий червоний.




3. Кодеїну фосфат визначають алкаліметрично у присутності спирто-хлороформної суміші, індикатор – фенолфталеїн.




**Метаболізм.** В організмі кодеїн на першій стадії піддається гідролізу, а на другій стадії піддається аналогічному метаболізму, що і морфіну гідрохлорид.



### 4.3. Фентаніл.



**Добування.** Синтез фентанілу здійснюють виходячи з 1-бензилпіперидина-4-нона, який конденсується з аніліном з отриманням відповідної основи Шиффа. Подвійний зв'язок в останньому відновлюють літієм алюмогідридом та отриманий 1-бензил-4-анілінопіперидин ацилують ангідридом пропіонової кислоти. Отриманий при цьому 1-бензил-4-N-пропіонілланілопіперидин піддають дібензилуванню воднем з використанням як каталізатор паладій, далі алкилюють 2-фенілтилхлоридом з отриманням фентанілу.




**Властивості:** Білий кристалічний порошок. Практично не розчинний у воді. Легко розчиняється у спирті.


### Ідентифікація:

1. Реакції із загальноосаджувальними алкалоїдними реактивами (реактив Драгедорфа, реактив Люголя, реактивом Майєра, з розчином пікринової кислоти).
2. В інтервалі pH = 1,5 – 7,0 з метиленовим помаранчевим утворюється асоціат червоного кольору, розчинний у хлороформі.
3. З 1%-м розчином лимонної кислоти в оцтовому ангідриді, при нагріванні набуває червоно-фіолетове забарвлення.


**Кількісне визначення.** Ацидиметрія в неводному середовищі ледяної оцтової кислоти. Титрант – розчин перхлоратної кислоти. Індикатор – кристалічний фіолетовий.




**Метаболізм.** Фентаніл має лінійну кінетику біотрансформації та метаболізується, насамперед, у печінці за допомогою ферментів CYP3A4. Головний метаболіт фентанілу – норфентаніл, який не є активним.



#### 4.4. Промедол.




**Добування.** Промедол отримують з диметилвінілкарбінолу.




**Властивості:** Білий кристалічний порошок. Добре розчинний у воді.

### Ідентифікація:

- Субстанція дає реакцію на хлориди.
- Реакція утворення пікрату жовтого кольору.




- З реактивом Марки у середовищі хлороформу утворюється кільце червоного кольору.




### Кількісне визначення.

1. Ацидиметрія у неводному середовищі у присутності ртуті (ІІ) ацетату.

Індикатор – кристалічний фіолетовий.



2. Алкаліметрія у присутності хлороформу.




3. Аргентометрія, зворотне титрування.


4. Йодометрія, зворотне титрування.

### Метаболізм:

**1. І фаза – гідроліз та деметилування:**



**2. ІІ фаза – утворення глюкоронидів:**



**Тестові завдання за темою: «Наркотичні анальгетики»**

**1.** Морфін належить до групи наркотичних анальгетиків. За хімічною будовою він є похідним:

- A.** Фенантренізохіноліну\*
- B.** Тропану
- C.** Бенздіазепіну
- D.** Піперидину
- E.** Фурану

**2.** Кодеїн застосовують як протикашльовий засіб. Вихідною речовиною для його синтезу є:

- A.** Морфін\*

- B.** Парацетамол
- C.** Пірокатехін
- D.** Нітрофурал
- E.** Кофеїн

**3.** Метаболізм морфіну здійснюється переважно у печінці. Основним шляхом його метаболізму є:

- A.** Глюкуронування\*
- B.** Гідроліз
- C.** Відновлення
- D.** Галогенування
- E.** Декарбоксилювання

- 4.** Завдяки наявності третинного атому нітрогену морфін утворює малорозчинні продукти при взаємодії з загальноалкалоїдними осадовими реактивами. З яким розчином він буде утворювати осад:
- A.** Калію тетрайоддвісмутату\*
  - B.** Амонію оксалату
  - C.** Кальцію хлориду
  - D.** Формальдегіду
  - E.** Калію піроантимонату
- 5.** Провізор-аналітик проводить ідентифікацію морфіну гідрохлориду. Завдяки наявності фенольного гідроксилу морфін утворює забарвлений продукт з розчином:
- A.** Заліза (ІІ) хлориду\*
  - B.** Хлористоводневої кислоти
  - C.** Пікринової кислоти
  - D.** Формальдегіду
  - E.** Калію піроантимонату
- 6.** Морфін є оптично активною речовиною. За допомогою якого пристроя провізор-аналітик вимірює кут обертання розчину морфіну гідрохлориду?
- A.** Поляриметр\*
- B.** Рефрактометр
- C.** Потенціометр
- D.** Ареометр
- E.** Спектрофотометр
- 7.** У медичній практиці морфін застосовується у вигляді гідрохлориду. Який розчин використовують для ідентифікації хлоридів:
- A.** Срібла нітрату\*
  - B.** Калію йодиду
  - C.** Натрію хлориду
  - D.** Кальцію фосфату
  - E.** Магнію гідроксиду
- 8.** Морфін вступає в реакцію азосполучення з утворенням азобарвника. Яка функціональна група забезпечує перебіг цієї реакції?
- A.** Фенольний гідроксил\*
  - B.** Альдегідна група
  - C.** Спиртовий гідроксил
  - D.** Карбоксильна група
  - E.** Естерна група
- 9.** Кількісне визначення морфіну гідрохлориду проводять методом ацидиметрії у неводному середовищі в присутності ртуті (ІІ) ацетату. Як титrant використовують розчин?

- A.** Хлорної кислоти\*
- B.** Натрію гідроксид
- C.** Калію перманганат
- D.** Натрію нітрату
- E.** Срібла нітрату

**10.** Кодеїн для медичних цілей

можна одержати напівситетичним шляхом з рослинного алкалоїду. Оберіть цей алкалоїд:

- A.** Морфін\*
- B.** Папаверин
- C.** Берберин
- D.** Протопін
- E.** Хелідонін

**11.** Яке забарвлення утворює кодеїн при нагріванні з розчином кислоти сірчаної концентрованої та заліза (ІІІ) хлориду і подальшому додаванні кислоти азотної концентрованої?

- A.** блакитне, що переходить у червоне\*
- B.** жовте, що переходить в оранжеве
- C.** синє, що переходить у фіолетове
- D.** червоне, що переходить у зелене

**E.** зелене, що переходить у чорне

**12.** Морфіну гідрохлорид, що містить фенольний гідроксил, можна відрізнити від кодеїну дією реактиву:

- A.**  $\text{FeCl}_3^*$
- B.**  $\text{BaCl}_2$
- C.**  $\text{HCl}$
- D.**  $\text{NaCl}$
- E.**  $\text{CaCl}_2$

**13.** До лікарських речовин, похідних морфінану, відноситься:

- A.** Кодеїн\*
- B.** Кофеїн
- C.** Хініну сульфат
- D.** Пахікарпіну гідроїодид
- E.** Кокаїну гідро хлорид

**14.** До лікарських речовин, похідних морфінану, відноситься:

- A.** Кодеїн\*
- B.** Кокаїну гідрохлорид
- C.** Хініну сульфат
- D.** Пахікарпіну гідроїодид
- E.** Кофеїн

**15.** Білий осад, утворений при взаємодії морфіну гідрохлориду з розчином аміаку,

розчиняється в розчині гідроксиду натрію за рахунок наявності в структурі морфіну гідрохлориду:

- A. Фенольного гідроксилу\*
- B. Карбоксильної групи
- C. Альдегідної групи
- D. Спиртового гідроксилу
- E. Кето-групи

**16.** Для проведення ідентифікації кодеїну фосфату, до складу яких входить фосфат-іон, провізор-аналітик використовує:

- A. Розчин срібла нітрату\*
- B. Розчин амоніаку
- C. Розчин ртуті нітрату
- D. Розчин кальцію хлориду
- E. Розчин натрію гідроксиду

**17.** У якості основного реагтиву при випробуванні на граничний вміст домішки фосфатів ДФУ рекомендує використовувати:

- A. Сульфомолібденовий реагент\*
- B. мідно-тартратний реагент
- C. тіоацетамідний реагент
- D. ацетилацетоновий реагент
- E. гіпофосфітний реагент

**18.** Провізор- аналітик проводить індентифікацію етилморфіну

гідрохлориду реакцією на хлориди за допомогою розчину:

- A. Срібла нітрату\*
- B. Барію хлориду
- C. Амонію оксалату
- D. Натрію гідроксиду
- E. Калію перманганату

**19.** Кількісний вміст лікарських засобів з групи алкалоїдів визначають методом кислотно-основного титрування у неводному середовищі. У якості титранту використовується розчин:

- A. Кислоти хлорної\*
- B. Натрію тіосульфату
- C. Кислоти сірчаної
- D. Калію бромату
- E. Срібла нітрату

**20.** Морфіну гідрохлорид згідно АНД титують розчином хлорної кислоти у середовищі безводної оцтової кислоти в присутності індикатора:

- A. Кристалічного фіолетового\*
- B. Тимолового синього
- C. Фенолфталейну
- D. Метилоранжу
- E. Метиленового синього


## **Ситуаційні задачі за темою: «Наркотичні анальгетики»**

1. Визначити масу наважки кодеїну (М.м. 299,39), якщо на її титрування буде витрачено 10,02 мл розчину хлоридної кислоти (КП = 0,9678). Відсотковий вміст кодеїну в лікарському засобі – 99,40%.
2. Визначити масову частку кодеїну фосфату (М.м. 397,36) в лікарському засобі, якщо на титрування наважки 0,2517 г було витрачено 6,19 мл 0,1 М розчину перхлоратної кислоти (КП = 0,9916).
3. Визначити об'єм 0,1 М розчину перхлоратної кислоти (КП – 0,9985), який буде витрачений на титрування наважки 0,1518 г морфіну гідрохлориду (М.м. 321,80). Відсотковий вміст морфіну гідрохлориду в лікарському засобі – 99,50%.
4. Визначити об'єм 0,1 М розчину хлорної кислоти (КП = 0,9835), який буде витрачений на титрування 0,1506 г морфіну гідрохлориду (М.м. 321,80), якщо кількісний вміст морфіну гідрохлориду в лікарському засобі – 99,00%.
5. Розрахуйте процентний вміст кодеїну фосфату (М.м. 397,36) у субстанції, якщо маса наважки складає 0,2517 г, об'єм 0,1 Н розчину хлорної кислоти (КП = 0,9916) у робочому досліді – 6,19 мл, у контрольному – 0,18 мл. втрата у вазі при висушуванні – 6,5%.


## **5. СНОДІЙНІ ЗАСОБИ**

### **5.1. Барбітурати**

#### **5.1.1. Барбітал**




**Добування.** Синтез засновано на добуванні відповідного малонового естера з наступною конденсацією з сечовою:




**Властивості:** Білий кристалічний порошок слабо гіркого смаку, без запаху. Малорозчинний у холодній воді, розчинний у спирті, легко розчинний у розчинах лугів, температура плавлення – 191 °C.

### Ідентифікація:


1. Визначення температури плавлення – 191 °C.
2. ІЧ-спектроскопія.
3. ТШХ.
4. Утворення комплексних солей з катіонами важких металів:
  - 4.1.3 аргентуму нітратом – білий осад:




4.2.3 кобальту (II) нітратом у присутності кальцію хлориду – синьо-фіолетове забарвлення та осад:




4.3.3 купруму (II) сульфатом в присутності калію гідрокарбонату і калію карбонату – синє забарвлення і осад червоно-бузкового кольору:



5. Реакція сплавлення з натрію гідроксидом з утворенням солей дизаміщених похідних оцтової кислоти, амоніаку і натрію карбонату:




При подальшому підкислені виділяються бульбашки газу ( $\text{CO}_2$ ) і відчувається характерний запах заміщених похідних оцтової кислоти:




6. Реакції утворення забарвлених продуктів при конденсації:

6.1.3 формальдегідом і кислотою сульфатною концентрованою утворюється жовте забарвлення:




6.2.3 *n*-диметиламінобензальдегідом і кислотою сульфатною концентрованою утворюється жовте забарвлення:




### Кількісне визначення:

1. Алкаліметрія в неводному середовищі. Наважку субстанції розчиняють у диметилформаміді (ДМФА) або суміші диметилформаміду і бензолу, нейтралізованому за тимоловим синім (підсилюють кислотні властивості барбітуратів) і титрують розчином натрію метилату або розчином натрію гідроксиду у суміші метанолу і бензолу, індикатор – тимоловий синій:





2. Алкаліметрія у водно-спиртовому середовищі. Наважку розчиняють у нейтралізованому за тимолфталеїном спирті для поліпшення розчинності:




3. Алкаліметрія за замісником. Метод г'рунтуються на утворенні срібної солі при взаємодії з розчином аргентуму нітрату в піридині, внаслідок чого виділяється еквівалентна кількість кислоти нітратної, яку відтитровують


спиртовим розчином натрію гідроксиду, індикатор – тимолфталейн.  
Паралельно проводять контрольний дослід:




4. Аргентометрія. Наважку барбіталу розчиняють у 5 %-вому розчині безводного натрію карбонату і титрують розчином аргентуму нітрату без індикатора до появи незникаючої каламуті:




**Метаболізм.** У I фазі метаболізму барбітал відщеплює етильний радикал і окислюється з утворенням спиртового гідроксилу у алкільного радикала в 5 положенні.




У II фазі метаболізму утворюються кон'югати нативних барбітуратів та їх окислених похідних із глукуроновою кислотою.



### 5.1.2. Фенобарбітал (Люмінал)



**Добування.** Синтез засновано на добуванні відповідного малонового естера з наступною конденсацією з сечовиною:



**Властивості:** Білий кристалічний порошок слабо гіркого смаку, без запаху. Дуже погано розчиняється в холодній воді, важко — у воді, що кипить (1:40), легко розчиняється в спирті та розчинах лугів.


#### Ідентифікація:

1. Визначення температури плавлення – 174 °C.
2. ІЧ-спектроскопія.


**3. ТІШХ.**

**4. Утворення комплексних солей з катіонами важких металів:**


4.1.3 аргентуму нітратом – білий осад:




**4.2.3 кобальту (II) нітратом у присутності кальцію хлориду – синьо-фіолетове забарвлення та осад:**





**4.3.3 купруму (II) сульфатом в присутності калію гідрокарбонату і калію карбонату – осад світло-бузькового кольору, що не змінюється при стоянні:**



**5. Реакція сплавлення з натрієм гідроксидом з утворенням солей дизаміщених похідних оцтової кислоти, амоніаку і натрію карбонату:**




При подальшому підкислені виділяються бульбашки газу ( $\text{CO}_2$ ) і відчувається характерний запах заміщених похідних оцтової кислоти:




**6.** Реакції утворення забарвлених продуктів при конденсації:


**6.1.3** формальдегідом і кислотою сульфатною концентрованою утворюється рожеве забарвлення:




**6.2.3** *n*-диметиламінобензальдегідом і кислотою сульфатною концентрованою утворюється рожеве забарвлення:



**7.** При взаємодії фенобарбіталу з натрію натратом (кристалевим) і кислотою сульфатною концентрованою з'являється жовте забарвлення:




Після відновлення нітро-групи можна провести реакцію утворення солі diazonію з наступним азосполученням. Утворюється азобарвник вишнево-червоного кольору:




### Кількісне визначення:



1. Алкаліметрія в неводному середовищі. Наважку субстанції розчиняють у диметилформаміді (ДМФА) або суміші диметилформаміду і бензолу, нейтралізованому за тимоловим синім (підсилюють кислотні властивості барбітуратів) і титують розчином натрію метилату або розчином натрію гідроксиду у суміші метанолу і бензолу, індикатор – тимоловий синій:




2. Алкаліметрія у водно-спиртовому середовищі. Наважку розчиняють у нейтралізованому за тимолфталейном спирті для поліпшення розчинності:




3. Алкаліметрія за замісником. Метод г'рунтується на утворені срібної солі при взаємодії з розчином аргентуму нітрату в піридині, внаслідок чого виділяється еквівалентна кількість кислоти нітратної, яку відтитровують спиртовим розчином натрію гідроксиду, індикатор – тимолфталейн. Паралельно проводять контрольний дослід:




4. Аргентометрія. Наважку фенобарбіталу розчиняють у 5 %-вому розчині безводного натрію карбонату і титрують розчином аргентуму нітрату без індикатора до появи незникаючої каламуті:




**Метаболізм.** Фенобарбітал у I фазі метаболізму окислюється з утворенням парагідроксипохідного фенільного радикала.




У II фазі метаболізму утворюються кон'югати нативних барбітуратів та їх окислених похідних із глюкуроновою кислотою.




### 5.1.3. Бензонал (Бензобарбітал)



**Добування.** Синтез засновано на добуванні відповідного малонового естера з наступною конденсацією з сечовиною:




Отриманий фенобарбітал реагує з хлорангідридом бензойної кислоти з отримання бензоналу:




**Властивості:** Білий кристалічний порошок без запаху. Тпл. – 134 – 137 °C. Дуже мало розчинний у воді, розчинний в етанолі і ефірі, легко розчинний у хлороформі.

### Ідентифікація:


1. Визначення температури плавлення – 134 – 137 °C.
  2. ІЧ-спектроскопія.
  3. ТШХ.
  4. Утворення комплексних солей з катіонами важких металів:
- 4.1.3 аргентуму нітратом – білий осад:**




**4.2.3** кобальту (II) нітратом у присутності кальцію хлориду – синьо-фіолетове забарвлення та осад:




**4.3.3** купруму (II) сульфатом в присутності калію гідрокарбонату і калію карбонату – сіро-блакитне забарвлення, що переходить в яскраво-синє, після чого випадає білий осад:



**5.** Реакція сплавлення з натрієм гідроксидом з утворенням солей дизаміщених похідних оцтової кислоти, амоніаку і натрієм карбонату:




При подальшому підкислені виділяються бульбашки газу ( $\text{CO}_2$ ) і відчувається характерний запах заміщених похідних оцтової кислоти:




**6.** Реакції утворення забарвлених продуктів при конденсації:

**6.1.3** формальдегідом і кислотою сульфатною концентрованою утворюється рожеве забарвлення:



**6.2.3** *n*-диметиламінобензальдегідом і кислотою сульфатною концентрованою утворюється рожеве забарвлення:




**7.** Бензонал після лужного гідролізу дає реакцію на бензоат-іон (з феруму (III) хлоридом – осад рожево-жовтого кольору):




**Кількісне визначення:**


1. Алкаліметрія в неводному середовищі. Наважку субстанції розчиняють у диметилформаміді (ДМФА) або суміші диметилформаміду і бензолу, нейтралізованому за тимоловим синім (підсилюють кислотні властивості барбітуратів) і титують розчином натрію метилату або розчином натрію гідроксиду у суміші метанолу і бензолу, індикатор – тимоловий синій:




2. Алкаліметрія у водно-спиртовому середовищі. Наважку розчиняють у нейтралізованому за тимолфталеїном спирті для поліпшення розчинності:




3. Алкаліметрія за замісником. Метод г'рунтується на утворені срібної солі при взаємодії з розчином аргентуму нітрату в піридині, внаслідок чого виділяється еквівалентна кількість кислоти нітратної, яку відтитровують спиртовим розчином натрію гідроксиду, індикатор – тимолфталеїн. Паралельно проводять контрольний дослід:




4. Аргентометрія. Наважку бензоналу розчиняють у 5 %-вому розчині безводного натрію карбонату і титрують розчином аргентуму нітрату без індикатора до появи незникаючої каламуті:



#### **5.1.4. Етамінал-натрій**




**Добування:** Синтез засновано на добуванні відповідного малонового естера з наступною конденсацією з сечовою:




**Властивості:** Білий дрібнокристалічний порошок. Гігроскопічний, розчинний у воді.

### Ідентифікація:


1. Визначення температури плавлення основи – 129 – 130 °C.
2. ІЧ-спектроскопія.
3. ТШХ.
4. Утворення комплексних солей з катіонами важких металів:
  - 4.1.3 аргентуму нітратом – білий осад:




- 4.2.3 кобальту (II) нітратом у присутності кальцію хлориду – синьо-фіолетове забарвлення та осад:




**4.3.3** купруму (ІІ) сульфатом в присутності калію гідрокарбонату і калію карбонату – осад блакитного кольору:



**5.** Реакція сплавлення з натрієм гідроксидом з утворенням солей дизаміщених похідних оцтової кислоти, амоніаку і натрію карбонату:




При подальшому підкислені виділяються бульбашки газу ( $\text{CO}_2$ ) і відчувається характерний запах заміщених похідних оцтової кислоти:



6. Реакції утворення забарвлених продуктів при конденсації:


6.1.3 *n*-диметиламінобензальдегідом і кислотою сульфатною концентрованою утворюється вишнево-червоне забарвлення:



7. Субстанція дає реакції на натрій.


### Кількісне визначення:

1. Ацидиметрія у водному середовищі, індикатор метиловий оранжевий:




2. Гравіметрія. Кислотну форму екстрагують ефіром з кислого розчину. Ефір відганяють, залишок висушують і зважують.


3. Аргентометрія. Наважку етаміналу натрію розчиняють у 5 %-вому розчині безводного натрію карбонату і титрують розчином аргентуму нітрату без індикатора до появи незникаючої каламуті:




**Метаболізм.** Етамінал-натрій окислюється в I фазі метаболізму з утворенням гідрокси- та карбоксипохідних в алкільних радикалах у положенні 5.




У II фазі метаболізму утворюються кон'югати нативних барбітуратів та їх окислених похідних із глюкуроновою кислотою.



### 5.1.5. Гексенал (Гексобарбітал)



**Добування.** Синтез засновано на добуванні відповідного малонового естера з наступною конденсацією з сечовиною:




**Властивості:** Біла піноподібна маса. На повітрі під впливом вуглекислого газу та пари води розкладається. Гігроскопічний. Дуже легко розчинний у воді та спирті, практично нерозчинний в ефірі. Водні розчини гексеналу є нестійкими, легко гідролізуються, розкладаються при стерилізації.


### Ідентифікація:

1. Визначення температури плавлення основи – 145 – 147 °C.
2. ІЧ-спектроскопія.
3. ТШХ.
4. Утворення комплексних солей з катіонами важких металів:


#### 4.1.3 аргентуму нітратом – білий осад:




#### 4.2.3 кобальту (II) нітратом у присутності кальцію хлориду – синьо-фіолетове забарвлення та осад:





#### 4.3.3 купруму (II) сульфатом в присутності калію гідрокарбонату і калію карбонату – блакитне забарвлення, що переходить в яскраво-синє, після чого випадає білий осад:



5. Реакція сплавлення з натрію гідроксидом з утворенням солей дизаміщених похідних оцтової кислоти, амоніаку і натрію карбонату:




При подальшому підкислені виділяються бульбашки газу ( $\text{CO}_2$ ) і відчувається характерний запах заміщених похідних оцтової кислоти:




6. Реакції утворення забарвлених продуктів при конденсації:

**6.1.3** формальдегідом і кислотою сульфатною концентрованою утворюється темно-червоне забарвлення з зеленою флуоресценцією:




**6.2.3** *n*-диметиламінобензальдегідом і кислотою сульфатною концентрованою утворюється жовте забарвлення:




7. Субстанція дає реакції на натрій.

8. Гексенал знебарвлює розчин калію перманганату і бромну воду (за рахунок наявності подвійного зв'язку):




### Кількісне визначення:


- ## 1. Ацидиметрія у водному середовищі, індикатор метиловий оранжевий:




2. Гравіметрія. Кислотну форму екстрагують ефіром з кислого розчину. Ефір відганяють, залишок висушують і зважують.
  3. Аргентометрія. Наважку гексеналу розчиняють у 5 %-вому розчині безводного натрію карбонату і титрують розчином аргентуму нітрату без індикатора до появи незникаючої каламуті:



### **5.1.6. Тіопентал натрій**




**Добування.** Синтезують алкилюванням етилмалонового естера 2-бромпентаном в присутності натрію етилату. Отриманий естер вводять у реакцію гетероциклізації з тіосечовиною, також використовують у якості основи натрію етилат:




**Властивості:** Суха пориста маса світло-жовтого або жовтувато-зеленого кольору зі специфічним запахом, гігроскопічна. Дуже легко розчинна у воді та етанолі, практично не розчинна в ефірі.

### Ідентифікація:


1. Визначення температури плавлення основи – 156 – 162 °C.
  2. ІЧ-спектроскопія.
  3. ТШХ.
  4. Утворення комплексних солей з катіонами важких металів:
- 4.1.3** аргентуму нітратом – білий з жовтим відтінком осад:




**4.2.3** кобальту (II) нітратом у присутності кальцію хлориду – синьо-фіолетове забарвлення та осад:




**4.3.3 купруму (II) сульфатом в присутності калію гідрокарбонату і калію карбонату – жовто-зелене забарвлення із завіссю:**



5. Субстанція дає реакції на натрій.
6. Субстанція дає реакції на сульфати після сухої мінералізації з сумішшю натрію карбонату і калію нітрату.
7. Визначення сульфуру при нагріванні субстанції з розчинами плюмбуму (II) ацетату і натрію гідроксиду. Утворюється чорний осад:






Після підкислення виділяється гідрогенсульфід:




#### **Кількісне визначення:**

1. Тіопентал-натрі переводять у кислотну форму і титрують розчином літію метилату:







**2.** Аргентометрія. Наважку тіопентал-натрій розчиняють у 5 %-вому розчині безводного натрію карбонату і титрують розчином аргентуму нітрату без індикатора до появи незникаючої каламуті:



## 5.2. Хлоралгідрат




**Добування.** Синтезують електрохімічним окисненням етилового спирту в присутності натрію або калію хлоридів:



**Властивості:** Безбарвні прозорі кристали або дрібнокристалічний порошок з характерним гострим запахом і злегка гіркуватим своєрідним смаком. Дуже легко розчинний у воді, дієтиловому ефірі та спирті. На повітрі повільно випаровується. Гігроскопічний.

### Ідентифікація:

**1.** Реакція «срібного дзеркала»:





2. Утворення хлороформу (характерний запах) при взаємодії з натрію гідроксидом:




### Кількісне визначення:


1. Ацидиметрія, зворотне титрування. До наважки субстанції додають розчин натрію гідроксиду, надлишок якого відтитровують розчином кислоти сульфатної:




2. Йодометрія, зворотне титрування, індикатор – крохмаль:




**Метаболізм.** Хлоралгідрат на I фазі відновлюється до трихлоретилового спирту. На II фазі піддається кон'югації з утворенням глюкурониду трихлоретилового спирту:



### 5.3. Бромізовал




**Добування.** Синтезують ацилуванням сечовини бромангідридом  $\alpha$ -бромізовалеріанової кислоти:



**Властивості:** Білий кристалічний порошок зі слабким запахом, дуже малорозчинний у воді, розчинний в етанолі.  $T_{\text{пл.}} = 145-150^\circ\text{C}$ .



### Ідентифікація:

- При нагріванні з розчинами лугів відбувається гідроліз і утворюється амоніак, який виявляють за запахом. Одночасно органічно зв'язаний бром переходить в іонний стан:




Після охолодження додають кислоту хлористоводневу розведену, хлорамін Б і хлороформ.


Вільний бром забарвлює хлороформний шар у жовтий колір:







- При нагріванні субстанції з розчином кислоти сульфатної з'являється різкий запах  $\alpha$ -бромізовалеріанової кислоти:



- Біуретова реакція на сечовину. При нагріванні субстанції з розчином купруму (II) сульфату в лужному середовищі з'являється рожево-червоне або (при надлишку купруму (II) сульфату) червоно-фіолетове забарвлення:



**Кількісне визначення.** Аргентометрія після лужного гідролізу, зворотне титрування за методом Фольгарда, індикатор – феруму (III) амонію сульфат. Паралельно проводять контрольний дослід.



### Тестові завдання за темою: «Снодійні засоби»

#### 1. Кількісне визначення субстанції

«Фенобарбітал» проводять методом алкаліметрії у неводному середовищі. Який реактив використовується як розчинник?

A. Диметилформамід\*

B. Оцтова кислота льодяна

C. Оцтовий ангідрид

D. Мурашина кислота

#### E. Етиловий спирт

2. Лікарський засіб «Фенобарбітал» належить до кислотних форм барбітуратів. Це дозволяє провізору-аналітику провести його кількісне визначення методом:

A. Алкаліметрії в неводному середовищі\*

- B. Ацидиметрії в неводному середовищі
- C. Зворотної йодометрії
- D. Зворотної цериметрії
- E. Прямої броматометрії
3. На хіміко-фармацевтичному підприємстві шляхом конденсації фенілетилмалонового ефіру з сечовою синтезується препарат, що пригнічує ЦНС. Назвіть цей лікарський засіб:
- A. Фенобарбітал\*
- B. Тріазолам
- C. Барбітал
- D. Нікотинова кислота
- E. Аскорбінова кислота
4. Для ідентифікації снодійних засобів, похідних барбітурової кислоти, використовують загальну фармакопейну реакцію. Для утворення забарвлених комплексних сполук використовують розчин:
- A. Кобальту нітрату\*
- B. Натрію нітрату
- C. Калію йодиду
- D. Натрію броміду
- E. Амонію хлориду
5. Кількісний вміст фенобарбіталу хімік-аналітик визначає методом алкаліметрії. Який титрований розчин він використовує?
- A. натрію гідроксид\*
- B. калію бромат
- C. срібла нітрат
- D. натрію едетат
- E. церію сульфат
6. Позитивна реакція “срібного дзеркала” вказує на наявність в структурі хлоралгідрату:
- A. Альдегідної групи\*
- B. Складноефірної групи
- C. Амідної групи
- D. Карбоксильної групи
- E. Нітрогрупи
7. Яку сполуку синтезують за реакцією між діетиловим ефіром малонової кислоти та сечовою?
- A. Барбітурову кислоту\*
- B. Бензойну кислоту
- C. Сечову кислоту
- D. Нікотинову кислоту
- E. Аскорбінову кислоту
8. Який лікарській речовині з групи барбітуратів відповідає хімічна назва 1-бензоїл-5-етил-5-фенілбарбітуррова кислота?

- A. Бензонал\*
- B. Барбітал
- C. Фенобарбітал
- D. Гексенал
- E. Бензобаміл
- 9.** Лікарський засіб фенобарбітал надає заспокійливу, снодійну і протиепілептичне дію. Назвіть його міжнародну непатентовану назву.
- A. Люмінал\*
- B. Нітрофурал
- C. Хлорамфенікол
- D. Діазепам
- E. Салол
- 10.** В якому із барбітуратів можна ідентифікувати залишок бензойної кіслоти гідроксамовою пробою?
- A. Бензонал\*
- B. Барбітал
- C. Фенобарбітал
- D. Гексанал
- E. Барбітал-натрій
- 11.** Барбітурова кислота є сильнішою кислотою, ніж оцтова. Це обумовлено:
- A. Кето-енольною таутомерією\*
- B. Лактам-лактимною таутомерією
- C. Прототропною таутомерією
- D. Ії циклічною будовою
- E. Наявністю в молекулі двох атомів азоту
- 12.** Провізор-аналітик виконує реакцію ідентифікації барбітуратів згідно ДФУ по утворенню синьо-фіолетового забарвлення з розчином:
- A. Кобальту нітрату\*
- B. Міді сульфату
- C. Заліза (ІІІ) хлориду
- D. Свинцю нітрату
- E. Нікелю нітрату
- 13.** При ідентифікації лікарської речовини реакцією з міді (ІІ) сульфатом у присутності калію гідрокарбонату та калію карбонату утворилось синє забарвлення та осад червоно-бузкового кольору. Назвіть цю лікарську речовину:
- A. Барбітал\*
- B. Антипірин
- C. Етакридину лактат
- D. Бензокайн
- E. Диазол

**14.** При сплавлені барбіталу з кристалічним гідроксидом натрію утворюється:

- A. 2-етилбутиноат натрію\*
- B. 2-метилбутиноат натрію
- C. Бутиноат натрію
- D. Етиноат натрію
- E. Пропаноат натрію

**15.** Хімік ВТК фармацевтичного підприємства проводить сплав лікарської речовини з натрію гідроксидом. Подальше підкислення продукту реакції призводить до виділення газу (диоксид вуглецю) і появичарактерного запаху фенілетилюцтової кислоти. Назвіть цю лікарську речовину:

- A. Фенобарбітал\*
- B. Резорцин
- C. Кодеїн
- D. Стрептоцид
- E. Феноксиметилпеніцилін

**16.** Який із барбітуратів знебарвлює бромну воду?

- A. Гексенал\*
- B. Барбітал
- C. Фенобарбітал
- D. Бензонал
- E. Барбітал-натрій

**17.** Гексенал у своїй структурі містить подвійний зв'язок, який можна визначити реакцією з:

- A. Бромною водою\*
- B. Розчином калію йодиду
- C. Баритовою водою
- D. Розчином кальцію гідроксиду
- E. Розчином амонію тіоцинату

**18.** Яка з наведених сполук є специфічною домішкою в субстанції етаміналу-натрію?

- A. Вільний луг\*
- B. Фенілбарбітуррова кислота
- C. Етилбарбітуррова кислота
- D. Семікарбазид
- E. Ванілін

**19.** Вкажіть, якому з нижче наведених лікарських засобів відповідає хімічна назва: 5,5-діетилбарбітуррова кислота?

- A. Барбітал\*
- B. Фенобарбітал
- C. Гексенал
- D. Бензонал
- E. Метилурацил

**20.** Студент фармацевтичного факультету проводить ідентифікацію лікарського

засобу за реакцією знебарвлення калію перманганату. Назвіть лікарський засіб.

А. Гексенал\*

- B. Нікотинамід
- C. Фенобарбітал
- D. Кордіамін
- E. Нікотинова кислота

## **Ситуаційні задачі за темою: «Снодійні засоби»**

1. Обчислити вміст барбіталу (М. м. 184,20), якщо на титрування точної наважки – 0,1516 г використано 8,0 мл 0,1 Н розчину гідроксиду натрію (КП = 1,0022).
  2. Обчислити вміст вільного лугу (М. м. NaOH 40,00) в барбіталі-натрію, якщо на його визначення використано 0,6 мл 0,05 Н розчину хлоридної кислоти (КП = 0,9986).
  3. Обчислити об'єм 0,9 М розчину гідроксиду натрію (КП = 1,0000), який буде використаний на титрування точної наважки – 0,1984 г фенобарбіталу (М. м. 232,24), якщо вміст фенобарбіталу — 98,4 %.
  4. Обчислити вміст вільного лугу (М. м. NaOH 40,00) в етаміналі-натрію, якщо при визначенні його вмісту використано 0,7 мл 0,05 Н розчину хлоридної кислоти (КП = 1,0000).
  5. Обчислити відсотковий вміст етаміналу-натрію (М. м. 248,26), якщо на титрування точної наважки 0,4786 г використано 18,4 мл 0,1 М р-ну хлоридної кислоти (КП = 1,0012). Вміст вільного лугу - 0,28 %, втрата в масі при висушуванні — 2,3 %.

## ЛІТЕРАТУРА

1. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство «Український науковий фармацевтний центр якості лікарських засобів». — 2-е вид. — Харків: Державне підприємство «Український науковий фармацевтний центр якості лікарських засобів». — 2016.
2. Державна фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство «Український науковий фарма-копейний центр якості лікарських засобів». — 2-е вид. — Харків: Державне підприємство «Український науковий фармацевтний центр якості лікарських засобів». 2014. — Т.1. — 1128 с.; — Т.2. — 724 с.; — Т.1. — 732 с.
3. Державна Фармакопея України / ДП "Науково-експертний фармацевтний центр". — 1-е вид. — Харків: "PIPEГ", 2001. Доповнення 4. — 2011. — 540 с.
4. Державна Фармакопея України / ДП "Науково-експертний фармацевтний центр". — 1-е вид. — Харків: "PIPEГ", 2001. Доповнення 3. — 2009. — 280 с.
5. Державна Фармакопея України / ДП "Науково-експертний фармацевтний центр". — 1-е вид. — Харків: "PIPEГ", 2001. Доповнення 2. — 2008. — 620 с.
6. Державна Фармакопея України / ДП "Науково-експертний фармацевтний центр". — 1-е вид. — Харків: "PIPEГ", 2001. Доповнення 1. — 2004. — 520 с.
7. Державна Фармакопея України. 1-е видання. — X.: "PIPEГ", 2001. — 531 с.
8. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 10th Edition. — 2021.
9. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, В.А. Георгіянц, І.С. Гриценко, І.В. та ін.: за ред. П.О. Безуглого. — Вінниця: Нова книга, 2017. — 456 с.
- 10.Фармацевтичний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.О. Безуглий, В.А. Георгіянц, І.С. Гриценко та ін.; за заг. ред. В.А. Георгіянц. — X.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. — 552 с.
- 11.Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. — Вінниця: Нова Книга, 2003. — 464 с.
- 12.Фармацевтична хімія. Загальна та спеціальна фармацевтична хімія. Лікарські засоби неорганічної природи: лабораторно-практичні заняття.

Навчальний посібник / Л.Г. Мішина. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2010. – 384 с.

- 13.Медична хімія: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / І.С. Гриценко, С.Г Таран, Л.О. Перехода та ін.; за заг ред. І.С. Гриценка. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. – 552с.
- 14.Від субстанції до ліків: Навч. посібник / [Безуглий П. А., Болотов В. В., Гриценко І. С. та ін.]; за ред. В. П. Черниха - Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2005. - 1244 с.
- 15.Цуркан О.О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: навч. посіб. / О.О. Цуркан, І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 152 с.
- 16.Медична хімія: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / І.С. Гриценко, С.Г Таран, Л.О. Перехода та ін.; за заг ред. І.С. Гриценка. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. – 552с.